

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**Ципрофлоксацин Экоцифол®**

наименование лекарственного препарата

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг

лекарственная форма, дозировка

АО «АВВА РУС», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « **16 06 21** » 20__ г

Старая редакция	Новая редакция
Показания к применению: Неосложненные и осложненные инфекции, вызванные чувствительными к ципрофлоксацину микроорганизмами. Для взрослых пациентов: - инфекции дыхательных путей, за исключением инфекций тяжелой степени тяжести. Ципрофлоксацин рекомендуется назначать при пневмониях, вызванных <i>Klebsiella spp.</i>, <i>Enterobacter spp.</i>, <i>Proteus spp.</i>, <i>Escherichia coli</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, <i>Haemophilus spp.</i>, <i>Moraxella catarrhalis</i>, <i>Legionella spp.</i> и стафилококками; - инфекции среднего уха (средний отит), особенно если эти инфекции	Показания к применению: Неосложненные и осложненные инфекции, вызванные чувствительными к ципрофлоксацину микроорганизмами. Для взрослых пациентов: - инфекции дыхательных путей. Ципрофлоксацин рекомендуется назначать при пневмониях, вызванных <i>Klebsiella spp.</i>, <i>Enterobacter spp.</i>, <i>Proteus spp.</i>, <i>Escherichia coli</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, <i>Haemophilus spp.</i>, <i>Moraxella catarrhalis</i>, <i>Legionella spp.</i> и стафилококками; - инфекции среднего уха (средний отит), особенно если эти инфекции вызваны грамотрицательными микроорганизмами, включая <i>Pseudomonas aeruginosa</i>; - инфекции глаз; - инфекции почек и/или осложненные

Старая редакция	Новая редакция
вызваны грамотрицательными микроорганизмами, включая <i>Pseudomonas aeruginosa</i> или стафилококки; • инфекции глаз; • инфекции почек и/или осложненные инфекции мочевыводящих путей; • инфекции половых органов, включая аднексит, гонорею, простатит; • инфекции брюшной полости (бактериальные инфекции желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих путей, перитонит); • инфекции кожи и мягких тканей; • инфекции или профилактика инфекций у пациентов со сниженным иммунитетом (пациенты, принимающие иммунодепрессанты или пациенты с нейтропенией); • селективная деконтаминация кишечника у пациентов со сниженным иммунитетом; • профилактика и лечение легочной формы сибирской язвы (инфицирование <i>Bacillus anthracis</i>); • профилактика инвазивных инфекций, вызванных <i>Neisseria meningitidis</i>. Для лечения следующих инфекционно-воспалительных заболеваний ципрофлоксацин может применяться только в качестве альтернативы другим	инфекции мочевыводящих путей; • инфекции половых органов, включая аднексит, гонорею, простатит; • инфекции брюшной полости (бактериальные инфекции желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих путей, перитонит); • инфекции кожи и мягких тканей; • инфекции костей и суставов; • сепсис; • инфекции или профилактика инфекций у пациентов со сниженным иммунитетом (пациенты, принимающие иммунодепрессанты, или пациенты с нейтропенией); • селективная деконтаминация кишечника у пациентов со сниженным иммунитетом; • профилактика и лечение легочной формы сибирской язвы (инфицирование <i>Bacillus anthracis</i>); • профилактика инвазивных инфекций, вызванных <i>Neisseria meningitidis</i>. Для лечения следующих инфекционно-воспалительных заболеваний ципрофлоксацин может применяться только в качестве альтернативы другим противомикробным препаратам: • острый синусит; • неосложненные инфекции мочевыводящих путей. Необходимо принимать во внимание действующие официальные руководства о

Старая редакция	Новая редакция
противомикробным препаратам: • острый синусит; • неосложненные инфекции мочевыводящих путей. Необходимо принимать во внимание действующие официальные руководства о правилах применения антибактериальных средств. Дети: • профилактика и лечение легочной формы сибирской язвы (инфицирование <i>Bacillus anthracis</i>) от 3 до 18 лет. Применение ципрофлоксацина у детей должно быть начато только после оценки соотношения польза/риск в связи с возможным побочным действием на суставы и околосуставные ткани. Противопоказания: Гиперчувствительность к ципрофлоксацину или вспомогательным веществам, а также другим препаратам из группы фторхинолонов; одновременный прием с тизанидином (риск выраженного снижения артериального давления, сонливости), возраст до 18 лет (до завершения процесса формирования скелета, кроме профилактики и лечения легочной формы сибирской язвы), беременность, период лактации.	правилах применения антибактериальных средств. Дети • лечение осложнений, вызванных <i>Pseudomonas aeruginosa</i> у детей с муковисцидозом легких от 5 до 17 лет; • профилактика и лечение легочной формы сибирской язвы (инфицирование <i>Bacillus anthracis</i>) от 5 до 18 лет (для данной лекарственной формы). Применение ципрофлоксацина у детей должно быть начато только после оценки соотношения польза / риск в связи с возможным побочным действием на суставы и околосуставные ткани. Противопоказания: Повышенная чувствительность к ципрофлоксацину или другим препаратам из группы фторхинолонов, а также к вспомогательным веществам (см. раздел «Состав»). Одновременное применение ципрофлоксацина и тизанидина из-за клинически значимых побочных эффектов (гипотензия, сонливость), связанных с увеличением концентрации тизанидина в плазме крови (см. раздел «Взаимодействия с другими лекарственными средствами»). Детский возраст до 18 лет (до завершения

Старая редакция	Новая редакция
	процесса формирования скелета) по всем показаниям, кроме терапии осложнений, вызванных <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , у детей с муковисцидозом легких (противопоказан у детей до 5 лет), а также для профилактики и лечения легочной формы сибирской язвы (противопоказан у детей до 5 лет). Беременность. Период грудного вскармливания.

Руководитель регуляторного отдела
АО «АВВА РУС»



Тукова М.М.

