

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ХЛОРОФИЛЛИПТ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Хлорофиллипт

Международное непатентованное или группировочное наименование: Эвкалипта
листьев экстракт

Лекарственная форма: раствор для местного применения масляный

Состав на 100 мл

Активного компонента

Хлорофиллипта экстракта густого – 2,0 г
(Эвкалипта листьев экстракт)
с антибактериальной активностью
в концентрации 12,5 мкг в 1 мл среды

Вспомогательного вещества

Масла подсолнечного – до 100 мл

Описание

Прозрачная темно-зеленая маслянистая жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Противомикробное средство растительного происхождения.

Код АТХ

D06BX.

Фармакологическое действие

Обладает антибактериальным (бактериостатическим и бактерицидным) действием, особенно в отношении стафилококков, в том числе антибиотикоустойчивых штаммов. Оказывает противовоспалительное действие.

Показания к применению

В комплексном лечении ожогов, долго незаживающих ран и трофических язв конечностей; эрозия шейки матки; в период грудного вскармливания для предупреждения трещин сосков.

Беременность и лактация

В период беременности применять после консультации с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способы применения и дозы

Применяют местно.

При лечении ожогов, долго незаживающих ран и трофических язв конечностей препарат используют в виде пропитанных масляным раствором марлевых повязок. Процедуру можно чередовать с применением 1 % спиртового раствора хлорофиллипта, разведенного 0,25 % раствором новокаина в соотношении 1 : 5. Курс лечения 2-3 недели.

При лечении эрозий шейки матки предварительно осушают тампонами все складки слизистой влагалища, влагалищной части шейки матки и смазывают канал шейки матки 2 % масляным раствором хлорофиллипта. Смоченный в препарате тампон оставляют на шейке матки на 15-20 мин. Манипуляции проводят в течение 10 дней ежедневно. В дальнейшем, на протяжении 2-х недель, после каждого спринцевания разведенным спиртовым раствором хлорофиллипта (1 столовая ложка препарата на 1 л воды), тампон, обильно смоченный масляным раствором хлорофиллипта, оставляют во влагалище на 12 часов. В случае неполной эпителизации эрозии курс лечения повторяют.

С целью предупреждения трещин сосков у кормящих матерей смазывают соски после каждого кормления. Перед началом следующего кормления препарат тщательно смывают кипяченой водой.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

При передозировке возможно усиление побочных эффектов.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При совместном использовании с перекисью водорода для обработки ожогов и трофических язв хлорофиллипт выпадает в осадок. Во избежание этого, после нанесения перекиси водорода, рану необходимо промыть стерильным изотоническим раствором натрия хлорида.

Особые указания

До лечения необходимо проверить чувствительность пациента к препарату путем местной аппликации небольшого количества препарата. При отсутствии через 6-8 часов аллергических реакций (гиперемия, зуд) можно назначать курсовое лечение препаратом; при наличии аллергических реакций препарат противопоказан.

Форма выпуска

Раствор для местного применения масляный, 2 %.

По 20 или 30 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми пластмассовыми.

По 20 или 30 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные крышками навинчиваемыми из полиэтилена низкого давления (в сборе с уплотнением).

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 20 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

**Держатель регистрационного удостоверения/Производитель/Организация,
принимаящая претензии потребителей**

ЗАО «ВИФИТЕХ»

142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.