

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Нейрокс

наименование лекарственного препарата

раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл

лекарственная форма, дозировка

ЗАО «ФармФирма «Сотекс», Российская Федерация

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «__» 23 08 13 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Показания к применению – острые нарушения мозгового кровообращения (в составе комплексной терапии); – дисциркуляторная энцефалопатия; – нейроциркуляторная дистония; – легкие когнитивные расстройства атеросклеротического генеза; – тревожные состояния при невротических и неврозоподобных состояниях; – абстинентный синдром при алкоголизме с преобладанием неврозоподобных и вегетативно-сосудистых расстройств;	Показания к применению – острые нарушения мозгового кровообращения (в составе комплексной терапии); – черепно-мозговая травма, последствия черепно-мозговых травм; – дисциркуляторная энцефалопатия; – синдром вегетативной (нейроциркуляторной) дистонии; – легкие когнитивные расстройства атеросклеротического генеза; – тревожные расстройства при невротических и неврозоподобных состояниях; – острый инфаркт миокарда (с первых

Старая редакция	Новая редакция
– острая интоксикация антипсихотическими лекарственными средствами.	суток) в составе комплексной терапии; – первичная открытоугольная глаукома различных стадий, в составе комплексной терапии; – купирование абстинентного синдрома при алкоголизме с преобладанием неврозоподобных и вегетативно-сосудистых расстройств; – острая интоксикация антипсихотическими лекарственными средствами.
С осторожностью: аллергические заболевания и реакции в анамнезе.	С осторожностью: аллергические заболевания и реакции в анамнезе, в том числе повышенная чувствительность к сульфитам.
Режим дозирования Внутримышечно или внутривенно (струйно или капельно). При инфузионном способе введения препарат следует разводить в 0,9 % растворе натрия хлорида. Дозы подбирают индивидуально. Начинают лечение с дозы 50–100 мг 1–3 раза в сутки, постепенно повышая ее до получения терапевтического эффекта. Струйно Нейрокс вводят медленно в течение 5–7 мин, капельно – со скоростью 40–60 капель в минуту. Максимальная суточная доза не должна превышать 800 мг. При острых нарушениях мозгового кровообращения Нейрокс применяют в	Способ применения и режим дозирования Внутримышечно (в/м) или внутривенно (в/в) (струйно или капельно). При инфузионном способе введения препарат следует разводить в 0,9 % растворе натрия хлорида. Струйно Нейрокс вводят медленно в течение 5–7 мин, капельно – со скоростью 40–60 капель в минуту. Максимальная суточная доза не должна превышать 1200 мг. <i>При острых нарушениях мозгового кровообращения</i> Нейрокс применяют в комплексной терапии в первые 10–14 дней – в/в капельно по 200–500 мг 2–4 раза в сутки, затем – в/м по 200–250 мг 2–3 раза в сутки в течение 2 недель.

Старая редакция	Новая редакция
комплексной терапии в первые 2–4 дня - внутривенно капельно по 200–300 мг 1 раз в сутки, затем - внутримышечно по 100 мг 3 раза в сутки. Продолжительность лечения составляет 10-14 сут. При дисциркуляторной энцефалопатии в фазе декомпенсации Нейрокс следует назначать внутривенно струйно или капельно в дозе 100 мг 2–3 раза в сутки на протяжении 14 дней. Затем - внутримышечно по 100 мг/сут на протяжении последующих 2 недель. Для курсовой профилактики дисциркуляторной энцефалопатии препарат вводят внутримышечно в дозе 100 мг 2 раза в сутки на протяжении 10–14 дней. При нейроциркуляторной дистонии, невротических и неврозоподобных состояниях препарат вводят внутримышечно по 50-400 мг в сутки в течение 14 дней. При абстинентном алкогольном синдроме Нейрокс вводят внутримышечно в дозе 100–200 мг 2–3 раза в сутки или внутривенно капельно 1–2 раза в сутки в течение 5–7 дней. При острой интоксикации антипсихотическими лекарственными средствами препарат вводят внутривенно в дозе 50–300 мг/сут на протяжении 7–14 дней. При легких когнитивных нарушениях у больных пожилого возраста и при тревожных расстройствах препарат	<i>При черепно-мозговой травме и последствиях черепно-мозговых травм</i> Нейрокс применяют в течение 10-15 дней в/в капельно по 200-500 мг 2-4 раза в сутки. <i>При дисциркуляторной энцефалопатии в фазе декомпенсации</i> Нейрокс следует назначать в/в струйно или капельно в дозе 200-500 мг 1-2 раза в сутки в течение 14 дней. Затем – в/м по 100-250 мг/сут в течение последующих 2 недель. <i>Для курсовой профилактики дисциркуляторной энцефалопатии</i> Нейрокс вводят в/м в дозе 200-250 мг 2 раза в сутки в течение 10-14 дней. <i>При нейроциркуляторной дистонии, невротических и неврозоподобных состояниях</i> препарат вводят в/м по 50-400 мг в сутки в течение 14 дней. <i>При легких когнитивных нарушениях у больных пожилого возраста и при тревожных расстройствах</i> препарат применяют в/м в дозе 100-300 мг в сутки в течение 14-30 дней. <i>При остром инфаркте миокарда в составе комплексной терапии</i> Нейрокс вводят в/в или в/м в течение 14 суток, на фоне традиционной терапии инфаркта миокарда (включающей нитраты, бета-адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), тромболитики, антикоагулянты и антиагрегантные препараты, а также симптоматические средства по показаниям).

Старая редакция	Новая редакция
применяют внутримышечно в суточной дозе 100–300 мг/сут на протяжении 14–30 дней.	В первые 5 суток Нейрокс вводят внутривенно, в последующие 9 суток препарат может вводиться внутримышечно. Внутривенное введение препарата производят путем капельной инфузии (медленно) в течение 30-90 минут (в 100-150 мл 0,9 % раствора натрия хлорида или 5 % раствора декстрозы (глюкозы)), при необходимости возможно медленное струйное в/в введение препарата, продолжительностью не менее 5 минут. Введение препарата (в/в или в/м) осуществляют 3 раза в сутки, через каждые 8 часов. Суточная доза составляет 6-9 мг/кг массы тела, разовая доза – 2-3 мг/кг массы тела. Максимальная суточная доза не должна превышать 800 мг, разовая – 250 мг. <i>При открытоугольной глаукоме различных стадий в составе комплексной терапии</i> Нейрокс вводят в/м по 100-300 мг/сутки, 1-3 раза в сутки в течение 14 дней. <i>При абстинентном алкогольном синдроме</i> Нейрокс вводят в/м или в/в капельно в дозе 200-500 мг 2-3 раза в сутки в течение 5-7 дней. <i>При острой интоксикации антипсихотическими лекарственными препаратами</i> препарат вводят в/в в дозе 200-500 мг/сут в течение 7-14 дней.

Начальник медицинского отдела
ЗАО «ФармФирма «Сотекс»

Тихонова И.В.