

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

Нейрокс®

наименование лекарственного препарата

раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 50 мг/мл

лекарственная форма, дозировка

ЗАО «ФармФирма «Сотекс», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 6

Дата внесения Изменения «__» 141217 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
ИНСТРУКЦИЯ	ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата	ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Показания к применению	Показания к применению
– острые нарушения мозгового кровообращения (в составе комплексной терапии);	– острые нарушения мозгового кровообращения (в составе комплексной терапии);
– черепно-мозговая травма, последствия черепно-мозговых травм;	– черепно-мозговая травма, последствия черепно-мозговых травм;
– дисциркуляторная энцефалопатия;	– дисциркуляторная энцефалопатия;
– синдром вегетативной (нейроциркуляторной) дистонии;	– синдром вегетативной (нейроциркуляторной) дистонии;
– легкие когнитивные расстройства атеросклеротического генеза;	– легкие когнитивные расстройства атеросклеротического генеза;
– тревожные расстройства при	– тревожные расстройства при

Старая редакция	Новая редакция
невротических и неврозоподобных состояниях; – острый инфаркт миокарда (с первых суток) в составе комплексной терапии; – первичная открытоугольная глаукома различных стадий, в составе комплексной терапии; – купирование абстинентного синдрома при алкоголизме с преобладанием неврозоподобных и вегетативно-сосудистых расстройств; – острая интоксикация антипсихотическими лекарственными средствами.	невротических и неврозоподобных состояниях; – острый инфаркт миокарда (с первых суток) в составе комплексной терапии; – первичная открытоугольная глаукома различных стадий, в составе комплексной терапии; – купирование абстинентного синдрома при алкоголизме с преобладанием неврозоподобных и вегетативно-сосудистых расстройств; – острая интоксикация антипсихотическими лекарственными средствами; – острые гнойно-воспалительные процессы брюшной полости (острый некротический панкреатит, перитонит) в составе комплексной терапии.
Способ применения и режим дозирования Внутримышечно (в/м) или внутривенно (в/в) (струйно или капельно). При инфузионном способе введения препарат следует разводить в 0,9 % растворе натрия хлорида. Струйно Нейрокс® вводят медленно в течение 5-7 мин, капельно – со скоростью 40-60 капель в минуту. Максимальная суточная доза не должна превышать 1200 мг. При острых нарушениях мозгового кровообращения Нейрокс® применяют в	Способ применения и дозы Внутримышечно (в/м) или внутривенно (в/в) (струйно или капельно). При инфузионном способе введения препарат следует разводить в 0,9 % растворе натрия хлорида. Струйно Нейрокс® вводят медленно в течение 5-7 мин, капельно — со скоростью 40-60 капель в минуту. Максимальная суточная доза не должна превышать 1200 мг. При острых нарушениях мозгового кровообращения Нейрокс® применяют в комплексной терапии в первые 10-

Старая редакция	Новая редакция
комплексной терапии в первые 10-14 дней – в/в капельно по 200-500 мг 2-4 раза в сутки, затем – в/м по 200-250 мг 2-3 раза в сутки в течение 2 недель. <i>При черепно-мозговой травме и последствиях черепно-мозговых травм</i> Нейрокс® применяют в течение 10-15 дней в/в капельно по 200-500 мг 2-4 раза в сутки. <i>При дисциркуляторной энцефалопатии в фазе декомпенсации</i> Нейрокс® следует назначать в/в струйно или капельно в дозе 200-500 мг 1-2 раза в сутки в течение 14 дней. Затем – в/м по 100-250 мг/сут в течение последующих 2 недель. <i>Для курсовой профилактики дисциркуляторной энцефалопатии</i> Нейрокс® вводят в/м в дозе 200-250 мг 2 раза в сутки в течение 10-14 дней. <i>При нейроциркуляторной дистонии, невротических и неврозоподобных состояниях</i> препарат вводят в/м по 50-400 мг в сутки в течение 14 дней. <i>При легких когнитивных нарушениях у больных пожилого возраста и при тревожных расстройствах</i> препарат применяют в/м в дозе 100-300 мг в сутки в течение 14-30 дней. <i>При остром инфаркте миокарда в составе комплексной терапии</i> Нейрокс® вводят в/в или в/м в течение 14 суток, на фоне традиционной терапии инфаркта миокарда (включающей нитраты, бета-	14 дней — в/в капельно по 200-500 мг 2-4 раза в сутки, затем – в/м по 200-250 мг 2-3 раза в сутки в течение 2 недель. <i>При черепно-мозговой травме и последствиях черепно-мозговых травм</i> Нейрокс® применяют в течение 10-15 дней в/в капельно по 200-500 мг 2-4 раза в сутки. <i>При дисциркуляторной энцефалопатии в фазе декомпенсации</i> Нейрокс® следует назначать в/в струйно или капельно в дозе 200-500 мг 1-2 раза в сутки в течение 14 дней. Затем — в/м по 100-250 мг/сут в течение последующих 2-х недель. <i>Для курсовой профилактики дисциркуляторной энцефалопатии</i> Нейрокс® вводят в/м в дозе 200-250 мг 2 раза в сутки в течение 10-14 дней. <i>При нейроциркуляторной дистонии, невротических и неврозоподобных состояниях</i> препарат вводят в/м по 50-400 мг в сутки в течение 14 дней. <i>При легких когнитивных нарушениях у больных пожилого возраста и при тревожных расстройствах</i> препарат применяют в/м в дозе 100-300 мг в сутки в течение 14-30 дней. <i>При остром инфаркте миокарда в составе комплексной терапии</i> Нейрокс® вводят в/в или в/м в течение 14 суток, на фоне традиционной терапии инфаркта миокарда (включающей нитраты, бета-адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензин-

Старая редакция	Новая редакция
адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), тромболитики, антикоагулянтные и антиагрегантные препараты, а также симптоматические средства по показаниям). В первые 5 суток Нейрокс[®] вводят внутривенно, в последующие 9 суток препарат может вводиться внутримышечно. Внутривенное введение препарата производят путем капельной инфузии (медленно) в течение 30-90 минут (в 100-150 мл 0,9 % раствора натрия хлорида или 5 % раствора декстрозы (глюкозы)), при необходимости возможно медленное струйное в/в введение препарата, продолжительностью не менее 5 минут. Введение препарата (в/в или в/м) осуществляют 3 раза в сутки, через каждые 8 часов. Суточная доза составляет 6-9 мг/кг массы тела, разовая доза – 2-3 мг/кг массы тела. Максимальная суточная доза не должна превышать 800 мг, разовая – 250 мг. <i>При открытоугольной глаукоме различных стадий в составе комплексной терапии</i> Нейрокс[®] вводят в/м по 100-300 мг/сутки, 1-3 раза в сутки в течение 14 дней. <i>При абстинентном алкогольном синдроме</i> Нейрокс[®] вводят в/м или в/в капельно в дозе 200-500 мг 2-3 раза в сутки в течение 5-7 дней. <i>При острой интоксикации</i>	превращающего фермента (АПФ), тромболитики, антикоагулянтные и антиагрегантные препараты, а также симптоматические средства по показаниям). В первые 5 суток, для достижения максимального эффекта, Нейрокс[®] вводят внутривенно, в последующие 9 суток препарат может вводиться внутримышечно. Внутривенное введение препарата производят путем капельной инфузии, медленно (во избежание побочных эффектов) в течение 30-90 минут (в 100-150 мл 0,9 % раствора натрия хлорида или 5 % раствора декстрозы (глюкозы)), при необходимости возможно медленное струйное в/в введение препарата, продолжительностью не менее 5 минут. Введение препарата (в/в или в/м) осуществляют 3 раза в сутки, через каждые 8 часов. Суточная доза составляет 6-9 мг/кг массы тела, разовая доза — 2-3 мг/кг массы тела. Максимальная суточная доза не должна превышать 800 мг, разовая — 250 мг. <i>При открытоугольной глаукоме различных стадий в составе комплексной терапии</i> Нейрокс[®] вводят в/м по 100-300 мг/сутки, 1-3 раза в сутки в течение 14 дней. <i>При абстинентном алкогольном синдроме</i> Нейрокс[®] вводят в/м или в/в капельно в дозе 200-500 мг 2-3 раза в сутки в течение 5-7 дней.

Старая редакция	Новая редакция
<i>антипсихотическими лекарственными препаратами</i> препарат вводят в/в в дозе 200-500 мг/сут в течение 7-14 дней.	<i>При острой интоксикации антипсихотическими лекарственными препаратами</i> препарат вводят в/в в дозе 200-500 мг/сут в течение 7-14 дней. <i>При острых гнойно-воспалительных процессах брюшной полости (острый некротический панкреатит, перитонит)</i> Нейрокс® назначают в первые сутки как в предоперационном, так и в послеоперационном периоде. Вводимые дозы зависят от формы и тяжести заболевания, распространенности процесса, вариантов клинического течения. Отмена препарата должна производиться постепенно только после устойчивого положительного клинико-лабораторного эффекта. <i>При остром отечном (интерстициальном) панкреатите</i> Нейрокс® назначают по 200-500 мг 3 раза в день, в/в капельно (в 0,9 % растворе натрия хлорида) и в/м. <i>Легкая степень тяжести некротического панкреатита</i> — по 100-200 мг 3 раза в день капельно (в 0,9 % растворе натрия хлорида) и в/м. <i>Средняя степень тяжести</i> — по 200 мг 3 раза в день, в/в капельно (в 0,9 % растворе натрия хлорида). <i>Тяжелое течение</i> — в пульс-дозировке 800 мг в первые сутки, при двукратном режиме введения; далее по 200-500 мг 2 раза в день с постепенным снижением суточной дозы. <i>Крайне тяжелое течение</i> — в начальной

Старая редакция	Новая редакция
	дозировке 800 мг/сут до стойкого купирования проявлений панкреатогенного шока, по стабилизации состояния по 300-500 мг 2 раза в день в/в капельно (в 0,9 % растворе натрия хлорида) с постепенным снижением суточной дозировки.

Начальник медицинского отдела
ЗАО «ФармФирма «Сотекс»



Тихонова И.В.

