ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА С ГЛЮКОЗОЙ

Регистрационный номер
Торговое название препарата: Аскорбиновая кислота с глюкозой
Международное непатентованное или группировочное название:
Аскорбиновая кислота +Декстроза.
Лекарственная форма:
Таблетки.
Состав препарата:
Активные компоненты:
аскорбиновой кислоты – 100 мг, декстрозы (глюкозы) – 877 мг.
Вспомогательные вещества: кальция стеарат, крахмал картофельный, тальк,
Описание: Таблетки белого цвета, плоскоцилиндрические с фаской и риской.

Фармакотерапевтическая группа:
Витамин.
Код АТХ: [A11GB].

Фармакологические свойства

Аскорбиновая кислота играет важную роль в регуляции окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свертываемости крови, регенерации тканей, способствует повышению сопротивляемости организма. Аскорбиновая кислота (витамин С) не образуется в организме человека, а поступает только с пищей. При сбалансированном и полноценном питании человек не испытывает дефицит в витамине С.

Декстроза участвует в различных процессах обмена веществ в организме, усиливает окислительно-восстановительные процессы в организме, улучшает антитоксическую функцию печени. Усваивается полностью организмом, почками не выводится (появление в моче является патологическим признаком).

Показания к применению

Профилактика и лечение гипо- и авитаминоза витамина С. Обеспечение повышенной потребности организма в витамине С в период роста, беременности, грудного вскармливания, при повышенных физических и умственных нагрузках, переутомлении, стрессовых состояниях, в период выздоровления после длительных и тяжелых заболеваний.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Не следует назначать большие дозы больным с повышенной свертываемостью крови, тромбофлебитами и склонностью к тромбозам, а также при сахарном диабете и состояниях, сопровождающихся повышенным содержанием сахара в крови.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь, после еды.
С профилактической целью назначают:
Взрослым - ½ - 1 таблетки в сутки.
В период беременности и лактации - по 3таблетки в сутки в течение 10-15 дней, затем по 1 таблетки в сутки.
С лечебной целью назначают:

Взрослым - по ½ -1 таблетки 3-5 раз в день; детям по ½ -1 таблетке 2-3 раза в день. Сроки лечения зависят от характера и течения заболевания и рекомендуются врачом.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции к компонентам препарата. Гипервитаминоз С.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Аскорбиновая кислота повышает всасывание препаратов группы пенициллина, железа.

Особые указания

В связи со стимулирующим действием аскорбиновой кислоты на образование кортикостероидных гормонов необходимо следить за функцией почек и артериальным давлением. При длительном применении больших доз возможно угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы, поэтому в процессе лечения необходимо регулярно контролировать функциональную способность поджелудочной железы. Лицам с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы следует применять препарат с осторожностью.

Форма выпуска Таблетки аскорбиновой кислоты 100 мг + декстрозы 877 мг
По 10 таблеток в контурной безъячейковой упаковке.
По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки в пачке картонной.

Срок годности

1 год. Не использовать препарат после истечения срока годности.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре от 18 до 22 ^{0}С.

Отпуск из аптек

Без рецепта.

Производитель
ООО «АСФАРМА»
652473, г. Анжеро-Судженск, Кемеровской обл., ул. Герцена, 7.
Тел./факс: (8 38453) 5-23-51; 5-24-95.

Директор ИДКЭЛС С.В. Буданов

Директор ООО «АСФАРМА» С.В. Пятков