МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ВИТАМИН С
(наименование лекарственного препарата)

таблетки, 100 мг+877 мг
(лекарственная форма, дозировка)

ООО «Анжеро-Судженский химико-фармацевтический завод», Россия
(наименование производителя, страна)

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

Дата внесения Изменения с «_____» 210416 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
	С осторожностью Гемохроматоз, сидеробластная анемия, талассемия, гипероксалурия, нефроуролитиаз (при применении в больших дозах); дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. **Применение при беременности и в период грудного вскармливания** Аскорбиновая кислота проникает через плацентарный барьер. Следует иметь в виду, что плод может адаптироваться к высоким дозам аскорбиновой кислоты, которую принимает беременная женщина, и затем у новорожденного возможно развитие аскорбиновой болезни как реакции отмены. Поэтому при беременности не следует принимать аскорбиновую кислоту в повышенных дозах, за исключением случаев, когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск. Аскорбиновая кислота выделяется с

Старая редакция	Новая редакция
	грудным молоком. Диета матери, содержащая адекватное количество аскорбиновой кислоты, достаточна для профилактики ее дефицита у грудного ребенка. Рекомендуется не превышать кормящей матерью максимум ежедневной потребности в аскорбиновой кислоте за исключением случаев, когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск.
Способ применения и дозы Препарат применяют внутрь, после еды. С профилактической целью назначают: Взрослым – ½-1 таблетки в сутки. В период беременности и лактации – по 3 таблетки в сутки в течение 10-15 дней, затем по 1 таблетки в сутки. С лечебной целью назначают: Взрослым – по ½ - 1 таблетки 3-5 раз в день; детям по ½-1 таблетке 2-3 раза в день. Сроки лечения зависят от характера и течения заболевания и рекомендуются врачом.	**Способ применения и дозы** Препарат применяют внутрь, после еды. С профилактической целью назначают: Взрослым – ½-1 таблетка в сутки. В период беременности и лактации – по 3 таблетки в сутки в течение 10-15 дней, затем по 1 таблетке в сутки. С лечебной целью назначают: Взрослым – по ½ - 1 таблетке 3-5 раз в день; детям по ½-1 таблетке 2-3 раза в день. Сроки лечения зависят от характера и течения заболевания и рекомендуются врачом.
Побочное действие Возможны аллергические реакции к компонентам препарата. Гипервитаминоз С.	**Побочное действие** Возможны аллергические реакции к компонентам препарата. Гипервитаминоз С. Раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея, спазм желудочно-кишечного тракта); угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы (гипергликемия, глюкозурия); при применении в высоких дозах –

Старая редакция	Новая редакция
	гипероксалурия и нефрокальциноз (оксалатный). Изменение лабораторных показателей: тромбоцитоз, гиперпротромбинемия, эритропения, нейтрофильный лейкоцитоз, гипокалиемия. **Передозировка** Симптомы: при применении более 1 г – головная боль, повышение возбудимости центральной нервной системы, бессонница, тошнота, рвота, диарея, гиперацидный гастрит, ульцерация слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы (гипергликемия, глюкозурия), гипероксалурия, нефролитиаз (из кальция оксалата), повреждение гломерулярного аппарата почек, умеренная поллакиурия (при приеме дозы более 600 мг/сут). Снижение проницаемости капилляров (возможно ухудшение трофики тканей, повышение артериального давления, гиперкоагуляция, развитие микроангиопатий). В случае приема внутрь потенциально токсической дозы вызывают рвоту, в редких случаях – промывают желудок, назначают активированный уголь, слабительные средства (например, изотонический раствор сульфата натрия).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами Аскорбиновая кислота повышает	**Взаимодействие с другими лекарственными средствами** Аскорбиновая кислота повышает

Старая редакция	Новая редакция
всасывание препаратов группы пенициллина, железа.	концентрацию в крови бензилпенициллина и тетрациклинов; в дозе 1 г/сут повышает биодоступность этинилэстрадиола (в т.ч. входящего в состав пероральных контрацептивов). Улучшает всасывание в кишечнике препаратов железа (переводит трехвалентное железо в двухвалентное); может повышать выведение железа при одновременном применении с дефероксамином. Снижает эффективность гепарина и непрямых антикоагулянтов. Ацетилсалициловая кислота, пероральные контрацептивы, свежие соки и щелочное питье снижают всасывание и усвоение. При одновременном применении с ацетилсалициловой кислотой повышается выведение с мочой аскорбиновой кислоты и снижается выведение ацетилсалициловой кислоты. Ацетилсалициловая кислота снижает абсорбцию аскорбиновой кислоты примерно на 30%. Увеличивает риск развития кристаллурии при лечении салицилатами и сульфаниламидами короткого действия, замедляет выведение почками кислот, увеличивает выведение лекарственных средств, имеющих щелочную реакцию (в т.ч. алкалоидов), снижает концентрацию в крови пероральных контрацептивов. Повышает общий клиренс этанола, который в свою очередь снижает концентрацию аскорбиновой кислоты в организме.

Старая редакция	Новая редакция
	Лекарственные средства хинолинового ряда, хлористый кальций, салицилаты, глюкокортикостероиды при длительном применении истощают запасы аскорбиновой кислоты. При одновременном применении уменьшает хронотропное действие изопреналина. При длительном применении или применении в высоких дозах может нарушать взаимодействие дисульфирам-этанол. В высоких дозах повышает выведение мексилетина почками, уменьшает терапевтическое действие антипсихотических лекарственных средств (нейролептиков) – производных фенотиазина, канальцевую реабсорбцию амфетамина и трициклических антидепрессантов. Барбитураты и примидон повышают выведение аскорбиновой кислоты с мочой.
Особые указания В связи со стимулирующим действием аскорбиновой кислоты на образование кортикостероидных гормонов необходимо следить за функцией почек и артериальным давлением. При длительном применении больших доз возможно угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы, поэтому в процессе лечения необходимо регулярно контролировать функциональную способность поджелудочной железы. Лицам с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы следует применять	**Особые указания** В связи со стимулирующим действием аскорбиновой кислоты на образование кортикостероидных гормонов необходимо следить за функцией почек и артериальным давлением. При длительном применении больших доз возможно угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы, поэтому в процессе лечения необходимо регулярно контролировать функциональную способность поджелудочной железы. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами,

Старая редакция	Новая редакция
препарат с осторожностью.	работать с точными механизмами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
Форма выпуска Таблетки аскорбиновой кислоты 100 мг + декстрозы 877 мг. 10 таблеток в контурной безъячейковой упаковке. 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению в пачке из картона. Контурные безъячейковые упаковки вместе с равным количеством инструкций по применению в групповой упаковке.	**Форма выпуска** Таблетки аскорбиновой кислоты 100 мг + декстрозы 877 мг. 10 таблеток в контурной безъячейковой упаковке. 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению в пачке из картона. 350 контурных безъячейковых упаковок вместе с равным количеством инструкций по применению в ящике из гофрированного картона (для стационаров).
Условия хранения В сухом, защищенном от света месте, при температуре от 18 до 22 °С. Хранить в недоступном для детей месте.	**Условия хранения** В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Генеральный директор
ООО «Анжеро-Судженский
химико-фармацевтический завод» Д.Г. Сосновских

Общество с ограниченной ответственностью "Анжеро-Судженский химико-фармацевтический завод" ОГРН 1034205050472 ИНН 4205051980 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск
Для документов

МЗ РФ
ФГБУ НЦЭСМП
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2