

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТАБЕТАГИСТИН
таблетки, 8 мг, 16 мг, 24 мг
ООО «Изварино Фарма», Россия

Изменение № 1

031218

Дата внесения Изменения «_____» _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав <u>1 таблетка 8 мг содержит:</u> <i>Активное вещество:</i> бетагистина дигидрохлорид – 8,0 мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> повидон – 2,0 мг, целлюлоза микрокристаллическая – 33,0 мг, лактозы моногидрат – 70,0 мг, кремния диоксид коллоидный – 2,5 мг, кросповидон – 6,0 мг, кислота стеариновая – 4,5 мг. <u>1 таблетка 16 мг содержит:</u> <i>Активное вещество:</i> бетагистина дигидрохлорид – 16,0 мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> повидон – 4,0 мг, целлюлоза микрокристаллическая – 66,0 мг, лактозы моногидрат – 140,0 мг, кремния диоксид коллоидный – 5,0 мг, кросповидон – 12,0 мг, кислота стеариновая – 9,0 мг. <u>1 таблетка 24 мг содержит:</u> <i>Активное вещество:</i> бетагистина дигидрохлорид – 24,0 мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> повидон – 6,0 мг, целлюлоза микрокристаллическая – 99,0 мг, лактозы моногидрат – 210,0 мг,	Состав <u>1 таблетка 8 мг содержит:</u> <i>Действующее вещество:</i> бетагистина дигидрохлорид – 8,0 мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, натрия кроскармеллоза, кросповидон, лимонной кислоты моногидрат, кремния диоксид коллоидный, натрия стеарилфумарат, гипромеллоза. <u>1 таблетка 16 мг содержит:</u> <i>Действующее вещество:</i> бетагистина дигидрохлорид – 16,0 мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, натрия кроскармеллоза, кросповидон, лимонной кислоты моногидрат, кремния диоксид коллоидный, натрия стеарилфумарат, гипромеллоза. <u>1 таблетка 24 мг содержит:</u> <i>Действующее вещество:</i> бетагистина дигидрохлорид – 24,0 мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, натрия кроскармеллоза, кросповидон, лимонной

111453 -

Старая редакция	Новая редакция
кремния диоксид коллоидный – 7,5 мг, кросповидон – 18,0 мг, кислота стеариновая – 13,5 мг.	кислоты моногидрат, кремния диоксид коллоидный, натрия стеарилфумарат, гипромеллоза.
Описание Таблетки белого или почти белого цвета двояковыпуклой формы, без риски (8 мг) или с риской (16 и 24 мг).	Описание <u>Таблетки 8 мг</u> Таблетки круглой формы, двояковыпуклые, белого или почти белого цвета. <u>Таблетки 16 мг и 24 мг</u> Таблетки круглой формы, двояковыпуклые, белого или почти белого цвета, с риской на одной стороне.
Условия хранения В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.	Условия хранения В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Начальник отдела регистрации
ООО «Изварино Фарма»



Е.А. Поспелова



111453