

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Винпотропил®

наименование лекарственного препарата

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг+800 мг

лекарственная форма, дозировка

ЗАО «Канонфарма продакшн», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 1

05 04 19

Дата внесения Изменения «___» _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав	Состав
1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой содержит:	1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит:
<i>активные вещества:</i> винпоцетин 10,0 мг, пирацетам 800,0 мг;	<i>действующие вещества:</i> винпоцетин 10,0 мг, пирацетам 800,0 мг;
<i>вспомогательные вещества:</i> кальция гидрофосфата дигидрат 120 мг, кроскармеллоза натрия (примеллоза) 33 мг, магния стеарат 7 мг, повидон 21 мг, тальк 7 мг, целлюлоза микрокристаллическая 102 мг;	<i>вспомогательные вещества:</i> кальция гидрофосфата дигидрат 105,3 мг, кроскармеллоза натрия 33,0 мг, магния стеарат 7,0 мг, макрогол 6000 (полиэтиленгликоль 6000) 14,7 мг, повидон К-30 21,0 мг, тальк 7,0 мг, целлюлоза микрокристаллическая 102,0 мг;
<i>состав пленочной оболочки:</i> Опадрай II коричневый 35 мг, в том числе: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) 9,8 мг, макрогол	<i>состав пленочной оболочки:</i> Опадрай 03F190003 прозрачный 11,0 мг, в том числе: гипромеллоза

Изменение № 1 к ЛП-001935-191217 С. 2

Старая редакция	Новая редакция
(полиэтиленгликоль) 3,5 мг, лактозы моногидрат (сахар молочный) 12,6 мг, краситель железа оксид красный 3,08 мг, краситель железа оксид черный 5,985 мг, титана диоксид 0,035 мг.	(гидроксипропилметилцеллюлоза) 8,8 мг, макрогол (полиэтиленгликоль) 2,2 мг. Опадрай II 32F265005 коричневый 24,000 мг, в том числе: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) 6,720 мг, макрогол (полиэтиленгликоль) 2,400 мг, лактозы моногидрат 8,400 мг, краситель железа оксид желтый 0,502 мг, краситель железа оксид красный 0,283 мг, краситель железа оксид черный 0,173 мг, титана диоксид 5,282 мг, тальк 0,240 мг.
Описание Таблетки овальные, с риской, покрытые пленочной оболочкой светло-коричневого цвета с сероватым оттенком. На поперечном разрезе почти белого цвета.	Описание Таблетки овальные двояковыпуклые с риской, покрытые пленочной оболочкой светло-коричневого цвета с сероватым оттенком. На поперечном разрезе почти белого цвета.
Форма выпуска Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг+800 мг.	Форма выпуска Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг+800 мг.
По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги	По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги

Изменение № 1 к ЛП-001935-191217 С. 3

Старая редакция	Новая редакция
алюминиевой печатной лакированной. По 3 или 6 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	алюминиевой печатной лакированной. По 60 или 90 таблеток в банку полимерную из полиэтилентерефталата с крышкой из полипропилена. По 3 или 6 контурных ячейковых упаковок или по 1 банке полимерной вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.
Условия хранения В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.	Условия хранения При температуре не выше 25 °С во вторичной упаковке (пачке картонной). Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности 2 года. Не применять по истечении срока годности.	Срок годности 3 года. Не применять по истечении срока годности.
Условия отпуска По рецепту.	Условия отпуска Отпускают по рецепту.

Директор департамента по регуляторным вопросам, клиническим исследованиям и разработкам новых ЛС
ЗАО «Канонфарма продакшн»

О.А. Лисакович

