МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
ПN014485/01-210721
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

Лайфевит
наименование лекарственного препарата

капсулы, 100 мг, 200 мг, 400 мг
лекарственная форма, дозировка

Санека Фармасьютикалс а.с., Словацкая Республика
наименование производителя, страна

Изменение № 6

Дата внесения Изменения «____» 210721 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
С осторожностью У больных тяжелым кардиосклерозом, перенесенным инфарктом миокарда, при повышенном риске развития тромбоэмболий; гипотромбинемия, вызванная недостаточностью витамина К, может ухудшиться при применении витамина Е в дозе более 400 МЕ (1 мг = 1,21 МЕ).	**С осторожностью** У больных тяжелым кардиосклерозом, перенесенным инфарктом миокарда, при повышенном риске развития тромбоэмболий; гипотромбинемия, вызванная недостаточностью витамина К, может ухудшиться при применении витамина Е в дозе более 400 МЕ (1 мг = 1,21 МЕ). Применение токоферола может повысить риск развития кровоизлияния в мозг. Следует соблюдать осторожность, особенно при длительном применении, а также при применении у пожилых пациентов или у лиц с наличием факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

МЗ РФ ФГБУ НЦЭСМП
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САНОФИ РОССИЯ» ОГРН 1027739079340 МОСКВА
«Санофи Россия»
Sanofi Russia AO
Отдел регистрации

Специалист по регистрации Симонова Е.В.

137435