



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Диоксидин®

раствор для инфузий и наружного применения 5 мг/мл

АО «Новосибхимфарм», Россия, АО «Валента Фарм», Россия

Изменение № 4

Дата внесения Изменения «03» 12 2019 г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска <u>При производстве на АО «Новосибхимфарм»</u> Раствор для инфузий и наружного применения 5 мг/мл. По 5 мл или 10 мл в ампулы нейтрального стекла. По 3, 5 или 10 ампул помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной. По 1 или 2 контурные ячейковые упаковки с инструкцией по применению и ножом для вскрытия ампул или скарификатором ампульным помещают в пачку из картона. При упаковке ампул с кольцом излома или точкой надлома нож для вскрытия ампул или скарификатор ампульный не вкладывают. <u>При производстве на АО «Валента Фарм»</u> Раствор для инфузий и наружного приме-	Форма выпуска <u>При производстве на АО «Новосибхимфарм»:</u> Раствор для инфузий и наружного применения 5 мг/мл. По 5 мл или 10 мл в ампулы нейтрального стекла. По 3, 5 или 10 ампул помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. <u>При производстве на АО «Валента Фарм»:</u> Раствор для инфузий и наружного приме-

Старая редакция	Новая редакция
нения 5 мг/мл. По 5 мл или 10 мл в ампулы нейтрального стекла. По 5 ампул помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	нения 5 мг/мл. По 5 мл или 10 мл в ампулы нейтрального стекла. По 5 ампул помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Руководитель дирекции
по регистрации ЛС и БАД
АО «Валента Фарм»



Н.В. Прилипухова