МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Триган-Д

наименование лекарственного препарата

Таблетки, 20 мг + 500 мг

лекарственная форма, дозировка

Кадила Фармасьютикалз Лимитед, Индия

наименование производителя, страна

Изменение № 3

Дата внесения изменения «____» 231118 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Раздел отсутствует	**Группировочное наименование:** Дицикловерин + Парацетамол
Состав Каждая таблетка содержит: Активные вещества: Парацетамол……-500 мг Дицикловерина гидрохлорид… ……-20 мг Вспомогательные вещества: крахмала натрия гликолат, крахмал маисовый, целлюлоза микрокристаллическая, повидон, кремния диоксид коллоидный (аэросил), магния стеарат	**Состав** Одна таблетка содержит: *Действующие вещества:* Парацетамол……-500 мг Дицикловерина гидрохлорид…… -20 мг *Вспомогательные вещества:* Карбоксиметилкрахмал натрия……25,0 мг Крахмал кукурузный……15,0 мг Целлюлоза микрокристаллическая…..17,5 мг Повидон К-30 ……4,5 мг Кремния диоксид коллоидный (аэросил)……3,0 мг Магния стеарат……5,0 мг
Описание: Белого цвета круглые, плоские гладкие таблетки со скошенными краями и риской на одной стороне.	**Описание:** Круглые плоскоцилиндрические таблетки белого цвета с фаской и риской на одной стороне.

104687

Старая редакция	Новая редакция
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ Со стороны желудочно-кишечного тракта: сухость во рту, потеря вкусовых ощущений, снижение аппетита, боли в эпигастрии, запоры, повышение активности «печеночных» ферментов, как правило, без развития желтухи, гепатанекроз (дозозависимый эффект). Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, крапивница, отек Квинке, мультиформная эксудативная эритема (в т.ч. синдром Стивенса-Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла). Со стороны центральной нервной системы (обычно развивается при приеме высоких доз): сонливость, головокружение, психомоторное возбуждение и нарушение ориентации. Со стороны эндокринной системы: гипогликемия, вплоть до гипогликемической комы. Со стороны органов кроветворения: анемия, метгемоглобинемия (цианоз, одышка, боли в сердце), гемолитическая анемия (особенно для больных с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы). Со стороны мочеполовой системы: пиурия, задержка мочи, интерстициальный нефрит, папилярный некроз. Со стороны органов зрения: мидриаз, нечеткость зрительного восприятия, паралич аккомодации, повышение внутриглазного давления. - снижение потенции.	**ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ** Со стороны желудочно-кишечного тракта: сухость во рту, потеря вкусовых ощущений, снижение аппетита, боли в эпигастрии, запоры, повышение активности «печеночных» ферментов, как правило, без развития желтухи, гепатанекроз (дозозависимый эффект). Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, крапивница, отек Квинке, мультиформная эксудативная эритема (в т.ч. синдром Стивенса-Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла). Со стороны центральной нервной системы (обычно развивается при приеме высоких доз): сонливость, головокружение, психомоторное возбуждение и нарушение ориентации, галлюцинации (частота неизвестна). Со стороны эндокринной системы: гипогликемия, вплоть до гипогликемической комы. Со стороны органов кроветворения: анемия, метгемоглобинемия (цианоз, одышка, боли в сердце), гемолитическая анемия (особенно для больных с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы). Со стороны мочеполовой системы: пиурия, задержка мочи, интерстициальный нефрит, папилярный некроз. Со стороны органов зрения: мидриаз, нечеткость зрительного восприятия, паралич аккомодации, повышение внутриглазного давления. - снижение потенции.

Старая редакция	Новая редакция
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ В сухом защищенном от света при температуре не выше 25 °С. Беречь от детей.	**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ** В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК Без рецепта	**УСЛОВИЯ ОТПУСКА** Отпускают по рецепту.

Уполномоченный представитель
Кадила Фармасьютикалз Лимитед, Индия

Горшков С.В.



