МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-000252-300620
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
РОТОКАН-ВИЛАР®

Регистрационный номер: ЛП-000252

Торговое наименование: РОТОКАН-ВИЛАР®

Международное непатентованное или группировочное наименование

(Календулы лекарственной цветков + Ромашки аптечной цветков + Тысячелистника обыкновенного травы) экстракт

Лекарственная форма: экстракт для приема внутрь и местного применения [жидкий]

Состав

Для приготовления 1000 мл препарата используют:

Ромашки аптечной цветки	- 500 г
Календулы лекарственной цветки	- 250 г
Тысячелистника обыкновенного трава	- 250 г
Вспомогательное вещество	
Этанол (спирт этиловый) 40 %	- достаточное количество для получения 1000 мл препарата.

Описание

Жидкость темно-коричневого цвета с оранжевым оттенком и с характерным запахом. При хранении допускается появление осадка.

Фармакотерапевтическая группа: противовоспалительное средство растительного происхождения.

Код АТХ: A01AB11.

Фармакологические свойства

Препарат оказывает местное противовоспалительное действие, обладает гемостатическими и спазмолитическими свойствами.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению

В стоматологии препарат применяют у взрослых при воспалительных заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта различной этиологии, таких как афтозный стоматит, пародонтит, язвенно-некротический гингивостоматит.

В гастроэнтерологии препарат применяют в комплексном лечении гастродуоденитов, хронических энтеритов и колитов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелые нарушения функции почек, нарушения функции печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

С осторожностью

Следует соблюдать осторожность при приеме препарата внутрь при нарушении функции почек легкой и средней тяжести, при гломерулонефрите, пие-

лонефрите.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Местно, внутрь, ректально.

Препарат применяют в виде водного раствора, который готовят перед применением путем добавления 1 чайной ложки препарата на стакан теплой кипяченой воды. При хорошей переносимости дозу можно увеличить до 3-х чайных ложек препарата на стакан воды.

В стоматологии лечение пародонта проводят после удаления зубных отложений и выскабливания патологических десневых карманов. В десневые карманы вводят на 20 минут тонкие турунды, обильно смоченные раствором препарата. Процедуру проводят 1 раз в сутки ежедневно или через день, всего 4-6 раз. При заболеваниях слизистой оболочки полости рта раствор препарата применяют путем аппликаций (15-20 минут) или ротовых полосканий (1-2 минуты) 2-3 раза в сутки в течение 2-5 дней.

В гастроэнтерологии препарат применяют внутрь и в микроклизмах. Внутрь применяют по 1/3-1/2 стакана раствора препарата за 30 минут до еды или через 40-60 минут после еды 3-4 раза в сутки. Курс лечения 2-3 недели.

Микроклизмы с 50-100 мл раствора препарата применяют после очистительной клизмы 1-2 раза в сутки. Курс лечения 3-6 дней.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

До настоящего времени сведений о случаях передозировки не зарегистрировано.

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможны головокружение, тошнота, рвота.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

В составе препарата содержится не менее 33 % этилового спирта.

В максимальной суточной дозе водного раствора, полученного путем добавления 1 чайной ложки препарата на стакан теплой кипяченой воды, содержание абсолютного этилового спирта составляет около 3,2 г.

В максимальной суточной дозе водного раствора, полученного путем добавления 3 чайных ложек препарата на стакан теплой кипяченой воды, содержание абсолютного этилового спирта составляет около 9,5 г.

При хранении возможно выпадение осадка. Перед применением содержимое флакона рекомендуется взбалтывать.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

При применении препарата внутрь следует воздержаться от занятия потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Экстракт для приема внутрь и местного применения [жидкий].

По 25 мл, 30 мл, 40 мл, 50 мл во флаконах из оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полиэтиленовыми из полиэтилена низкой плотности и крышками пластмассовыми навинчиваемыми.

По 50 мл в импортных флаконах темного стекла с винтовой горловиной, закрытых крышками пластмассовыми навинчиваемыми с контрольным кольцом, снабженными уплотнительной прокладкой.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска

Без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Акционерное общество «Фармцентр ВИЛАР».

Адрес: Россия, 123458, город Москва, улица Маршала Прошлякова, дом 30, этаж 2, офис 206.

Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей

Акционерное общество «Фармцентр ВИЛАР».

Адрес места производства лекарственного препарата (производственной площадки): Россия, 117216, город Москва, улица Грина, дом 7, строение 15, строение 27, строение 29.

Тел./факс: (495) 388-47-00.

Интернет-сайт: www.vilar-plant.ru

Генеральный директор
АО «Фармцентр ВИЛАР» В.В. Степанов