

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Калия хлорид

наименование лекарственного препарата

Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 40 мг/мл

лекарственная форма, дозировка

ООО «Славянская аптека», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 3

110822

Дата внесения Изменения «__» _____ 2021 г.

Старая редакция	Новая редакция
Торговое название: Калия хлорид	Торговое наименование: Калия хлорид
Состав на 1 мл: <u>Активное вещество:</u> калия хлорид - 40 мг. <u>Вспомогательные вещества:</u> декстрозы моногидрат (глюкоза) (в пересчете на безводную) - 334 мг, 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты до pH 3,0 - 4,0; вода для инъекций до 1 мл.	Состав на 1 мл: <i>Действующее вещество:</i> калия хлорид - 40,0 мг <i>Вспомогательные вещества:</i> декстрозы моногидрат (глюкоза) (в пересчете на безводную) - 334,0 мг хлористоводородной кислоты до pH 3,0 раствор 0,1 М - 4,0 вода для инъекций до 1 мл
Описание: прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость.	Описание: прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость
Код АТХ: [A12BA01]	Код АТХ: A12BA01
Применение при беременности и лактации	Применение при беременности и в период грудного вскармливания


146746

Старая редакция	Новая редакция
Применение в период беременности возможно только по назначению врача, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или младенца. В период лактации необходимо решить вопрос о прекращении грудного вскармливания. По возможности, при беременности и в период лактации, необходимо назначать препараты калия для приема внутрь.	Применение в период беременности возможно только по назначению врача, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или младенца. В период лактации необходимо решить вопрос о прекращении грудного вскармливания. По возможности, при беременности и в период лактации, необходимо назначать препараты калия для приема внутрь.
Побочное действие Неблагоприятные побочные реакции могут развиваться в виде симптомов гиперкалиемии только в случае абсолютной или относительной передозировки и/или слишком высокой скорости инфузии. Частота развития неблагоприятных побочных реакций зависит от дозы. <i>Нарушения со стороны иммунной системы:</i> аллергические реакции. <i>Нарушения со стороны обмена веществ и питания:</i> ацидоз, гиперхлоремия, гиперкалиемия. <i>Нарушения со стороны нервной системы:</i> утомляемость, мышечная слабость, спутанность сознания, тяжесть в конечностях, мышечные судороги, парестезии, восходящий паралич. <i>Нарушения со стороны сердца:</i> брадикардия, АВ блокада, фибрилляция желудочков, остановка сердца. Слишком	Побочные действия Неблагоприятные побочные реакции могут развиваться в виде симптомов гиперкалиемии только в случае абсолютной или относительной передозировки и/или слишком высокой скорости инфузии. Частота развития неблагоприятных побочных реакций зависит от дозы. <i>Нарушения со стороны иммунной системы:</i> аллергические реакции. <i>Нарушения со стороны обмена веществ и питания:</i> ацидоз, гиперхлоремия, гиперкалиемия. <i>Нарушения со стороны нервной системы:</i> утомляемость, мышечная слабость, спутанность сознания, тяжесть в конечностях, мышечные судороги, парестезии, восходящий паралич. <i>Нарушения со стороны сердца:</i> брадикардия, АВ блокада, фибрилляция желудочков, остановка сердца. Слишком высокая скорость инфузии может вызвать

Старая редакция	Новая редакция
высокая скорость инфузии может вызвать сердечную аритмию. <i>Нарушения со стороны сосудов:</i> снижение артериального давления, централизация кровообращения. <i>Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта:</i> тошнота.	сердечную аритмию. <i>Нарушения со стороны сосудов:</i> снижение артериального давления, централизация кровообращения. <i>Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта:</i> тошнота.
Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.	Срок годности 3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия отпуска из аптек По рецепту.	Условия отпуска По рецепту.
Владелец Регистрационного удостоверения: ООО «Славянская аптека», Россия 601125, Владимирская обл., Петушинский район, п. Вольгинский, тел./факс: 8 (495) 742-60-36, 8 (495) 450-26-54.	Владелец регистрационного удостоверения ООО «Славянская аптека», Россия 601125, Владимирская обл., Петушинский район, п. Вольгинский тел.: +7 (495) 510-60-95; +7 (49243) 7-11-31; +7 (4922) 37-90-21
Производитель/Претензии потребителей направлять по адресу: ООО «Славянская аптека», Россия 601125, Владимирская обл., Петушинский район, п. Вольгинский, тел./факс: 8 (495) 742-60-36, 8 (495) 450-26-54.	Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей ООО «Славянская аптека», Россия 601125, Владимирская обл., Петушинский район, п. Вольгинский тел.: +7 (495) 510-60-95; +7 (49243) 7-11-31; +7 (4922) 37-90-21 сайт: www.slavapteca.ru

Генеральный директор

ООО «Славянская аптека»



Варламов И.В.

146746