

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ФЛАМАКС®

наименование лекарственного препарата

раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 50 мг/мл
лекарственная форма, дозировка

ЗАО «ФармФирма «Сотекс», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 4

Дата внесения Изменения «__» 310120 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Внутривенно, внутримышечно. <u>Внутримышечное введение:</u> по 100 мг (1 ампула) 1-2 раза в день. Внутривенное инфузионное введение препарата должно проводиться только в условиях стационара. Среднее время инфузии составляет 0,5-1 час, максимальное – не более 48 часов, при этом доза препарата не должна превышать 300 мг. <u>Непродолжительная внутривенная инфузия:</u> 100 - 200 мг (1-2 ампулы) препарата, разведенного в 100 мл 0,9 % раствора натрия хлорида, вводится в течение 0,5-1 часа. Возможно повторное введение через 8 часов. <u>Продолжительная внутривенная инфузия:</u> 100 - 200 мг (1-2 ампулы) препарата, разведенного в 500 мл раствора для инфузий (0,9 % раствор натрия хлорида, раствор Рингера, 5 % раствор декстрозы) в	Способ применения и дозы Внутривенно, внутримышечно. <u>Внутримышечное введение:</u> по 100 мг (1 ампула) 1-2 раза в день. Продолжительность внутримышечного введения препарата не должна превышать 2-3 дней. При необходимости дальнейшую терапию кетопрофеном продолжают с применением других лекарственных форм (таблетки, капсулы, суппозитории). Внутривенное инфузионное введение препарата должно проводиться только в условиях стационара. Среднее время инфузии составляет 0,5-1 час, максимальное – не более 48 часов, при этом доза препарата не должна превышать 300 мг. <u>Непродолжительная внутривенная инфузия:</u> 100 - 200 мг (1-2 ампулы) препарата, разведенного в 100 мл 0,9 % раствора натрия хлорида, вводится в течение 0,5-1 часа. Возможно повторное введение через

течение 8 часов. Возможно повторное введение через 8 часов. <u>Комбинированное применение</u> ФЛАМАКС® можно сочетать с анальгетиками центрального действия; его можно смешивать с морфином в одном флаконе. Нельзя смешивать в одном флаконе с трамадолом из-за выпадения осадка. Парентеральное введение ФЛАМАКС® можно сочетать с применением пероральных форм (таблетки, капсулы) или ректальных суппозиториях, при этом суммарная суточная доза может быть увеличена до 300 мг или уменьшена до 100 мг в зависимости от характера заболевания и состояния больного. Следует использовать минимальную эффективную дозу минимально возможным коротким курсом (см. раздел «Особые указания»).	8 часов. <u>Продолжительная внутривенная инфузия:</u> 100 - 200 мг (1-2 ампулы) препарата, разведенного в 500 мл раствора для инфузий (0,9 % раствор натрия хлорида, раствор Рингера, 5 % раствор декстрозы) в течение 8 часов. Возможно повторное введение через 8 часов. <u>Комбинированное применение</u> ФЛАМАКС® можно сочетать с анальгетиками центрального действия; его можно смешивать с морфином в одном флаконе. Нельзя смешивать в одном флаконе с трамадолом из-за выпадения осадка. Парентеральное введение ФЛАМАКС® можно сочетать с применением пероральных форм (таблетки, капсулы) или ректальных суппозиториях, при этом суммарная суточная доза может быть увеличена до 300 мг или уменьшена до 100 мг в зависимости от характера заболевания и состояния больного. Следует использовать минимальную эффективную дозу минимально возможным коротким курсом (см. раздел «Особые указания»).
---	--

Начальник медицинского отдела
ЗАО «ФармФирма «Сотекс»



Тихонова И.В.

ТИХОНОВА И.В.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 17-03/636 ОТ 17.12.18

