

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Сорбодез®

наименование лекарственного препарата

суспензия для приема внутрь, 70 мг/мл**суспензия для приема внутрь [со вкусом и ароматом лимона], 70 мг/мл****суспензия для приема внутрь [со вкусом и ароматом мяты], 70 мг/мл**

лекарственная форма, дозировка

ООО НПО «ФармВИЛАР», Россия

наименование производителя, страна

Регистрационный номер: № ЛП-008367

Изменение № 1

Дата внесения Изменения « ____ » _____ 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав (на 100 мл): <i>Действующее вещество:</i> кремния диоксид коллоидный – 7,000 г. <i>Вспомогательные вещества:</i> калия сорбат – 0,150 г, вода очищенная – до 100 мл.	Состав (на 100 мл): <i>Суспензия для приема внутрь</i> <i>Действующее вещество:</i> кремния диоксид коллоидный – 7,000 г. <i>Вспомогательные вещества:</i> калия сорбат – 0,150 г, натрия бензоат – 0,0513 г, вода очищенная – до 100 мл. <i>Суспензия для приема внутрь [со вкусом и ароматом лимона]</i> <i>Действующее вещество:</i> кремния диоксид коллоидный – 7,000 г. <i>Вспомогательные вещества:</i> калия сорбат – 0,150 г, натрия бензоат – 0,0513 г, ароматизатор «Лимон» – 0,2 г, вода очищенная – до 100 мл. <i>Суспензия для приема внутрь [со вкусом и ароматом мяты]</i> <i>Действующее вещество:</i> кремния диоксид коллоидный – 7,000 г. <i>Вспомогательные вещества:</i> калия сорбат – 0,150 г, натрия бензоат – 0,0513 г, ароматизатор «Мята» – 0,004 г, вода очищенная – до 100 мл.

Старая редакция	Новая редакция
Описание: суспензия белого цвета. Допускается оседание частиц суспензии при хранении.	Описание: <i>Суспензия для приема внутрь</i> Суспензия белого цвета. Допускается оседание частиц суспензии при хранении. Допускается загустевание суспензии при хранении. Загустевание носит обратимый характер, после интенсивного встряхивания или разминания суспензия возвращается к жидкому состоянию. <i>Суспензия для приема внутрь [со вкусом и ароматом лимона]</i> Суспензия белого цвета с запахом лимона. Допускается оседание частиц суспензии при хранении. Допускается загустевание суспензии при хранении. Загустевание носит обратимый характер, после интенсивного встряхивания или разминания суспензия возвращается к жидкому состоянию. <i>Суспензия для приема внутрь [со вкусом и ароматом мяты]</i> Суспензия белого цвета с запахом мяты. Допускается оседание частиц суспензии при хранении. Допускается загустевание суспензии при хранении. Загустевание носит обратимый характер, после интенсивного встряхивания или разминания суспензия возвращается к жидкому состоянию.
Форма выпуска Суспензия для приема внутрь, 70 мг/мл. По 100 мл, 150 мл, 200 мл во флаконы из полиэтилентерефталата в комплекте с колпачками навинчиваемыми из полиэтилена ПЭВД. По 100 мл, 150 мл или 200 мл во флаконы темного стекла с крышками из полиэтилена низкой плотности или полипропилена с контролем первого вскрытия. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. В картонную упаковку могут вкладывать мерный стаканчик полипропиленовый или мерную ложку полипропиленовую.	Форма выпуска Суспензия для приема внутрь, 70 мг/мл. Суспензия для приема внутрь [со вкусом и ароматом лимона], 70 мг/мл. Суспензия для приема внутрь [со вкусом и ароматом мяты], 70 мг/мл. По 100 мл, 150 мл, 200 мл во флаконы из полиэтилентерефталата в комплекте с колпачками навинчиваемыми из полиэтилена ПЭВД. По 100 мл, 150 мл или 200 мл во флаконы темного стекла с крышками из полиэтилена низкой плотности или полипропилена с контролем первого вскрытия.

Старая редакция	Новая редакция
По 100 мл, 150 мл, 200 мл, 250 мл в тубы ламинатные (ABL) алюминиевые в комплекте с колпачками полипропиленовыми. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. В картонную упаковку могут вкладывать мерный стаканчик полипропиленовый или мерную ложку полипропиленовую. По 25 мл в пакетики из упаковочного комбинированного материала. По 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20, 24, 30 или 40 пакетиков вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона по ГОСТ 33781-2016. Пакетики могут быть размещены индивидуально или скреплены попарно.	Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона. В картонную упаковку могут вкладывать мерный стаканчик полипропиленовый или мерную ложку полипропиленовую. По 100 мл, 150 мл, 200 мл, 250 мл в тубы ламинатные (ABL или PBL) в комплекте с колпачками полипропиленовыми. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона. В картонную упаковку могут вкладывать мерный стаканчик полипропиленовый или мерную ложку полипропиленовую. По 25 мл в пакетики из упаковочного комбинированного материала. По 2-40 пакетиков вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона. Пакетики могут быть размещены индивидуально или скреплены попарно.
Срок годности 2 года. После вскрытия хранить в холодильнике не более 7 суток*. Не применять по истечении срока годности. * - для фасовки во флаконы и тубы.	Срок годности 2 года. После вскрытия хранить не более 14 суток*. Не применять по истечении срока годности. * - для фасовки во флаконы и тубы.

Генеральный директор
ООО НПО «ФармВИЛАР»



К.Ю. Калиниченко