

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Спарекс®

наименование лекарственного препарата

капсулы пролонгированного действия, 200 мг

лекарственная форма, дозировка

ЗАО «Канонфарма продакшн», Россия

наименование производителя, страна


Изменение № 1

Дата внесения Изменения « » 29 09 11 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: Одна капсула содержит активное вещество мебеверина гидрохлорид 200 мг; вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный (аэросил), гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза марки Бенецел МР 874), повидон (пласдон К 90, коллидон 90 F), магния стеарат; состав капсулы твердой желатиновой: корпус и крышечка – титана диоксид, желатин, краситель хинолиновый желтый, краситель солнечный закат желтый. Фармакологическое действие Спазмолитик миотропного действия,	Состав: Одна капсула содержит активное вещество мебеверина гидрохлорид 200 мг; вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный (аэросил) – 5 мг, гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) – 38 мг, повидон (пласдон К 90, коллидон 90 F) – 5 мг, магния стеарат – 2 мг; состав капсулы твердой желатиновой: корпус и крышечка – титана диоксид, желатин, краситель хинолиновый желтый, краситель солнечный закат желтый Фармакологическое действие Спазмолитик миотропного действия,

Старая редакция	Новая редакция
оказывает прямое действие на гладкую мускулатуру желудочно-кишечного тракта (главным образом толстого кишечника). Устраняет спазм без влияния на нормальную перистальтику кишечника. Ингибирует фосфодиэстеразу. Стабилизирует уровень циклической аденозинмонофосфорной кислоты. Не обладает антихолинергическим действием. Противопоказания Гиперчувствительность, порфирия, беременность, детский возраст до 12 лет. С осторожностью Период лактации. Особые указания В период лечения необходимо воздерживаться от вождения автотранспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Условия хранения Список Б. Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.	оказывает прямое действие на гладкую мускулатуру желудочно-кишечного тракта (главным образом толстого кишечника). Устраняет спазм без влияния на нормальную перистальтику кишечника. Не обладает антихолинергическим действием. Противопоказания Гиперчувствительность, детский возраст (в связи с недостаточностью данных по эффективности и безопасности). С осторожностью Применение при беременности и в период лактации Применять препарат у беременных следует с осторожностью, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Не следует принимать Спарекс® во время кормления грудью. Особые указания В период лечения следует соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и во время занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Условия хранения Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Начальник отдела регистрации
ЗАО «Канонфарма продакшн»



Г.У. Сетдекова