

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**

ПРИМАФУНГИН®

(наименование лекарственного препарата)

суппозитории вагинальные, 100 мг

(лекарственная форма, дозировка)

ООО «Авексима Сибирь», Россия

(наименование производителя, страна)

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 110419

Дата внесения Изменения « ____ » _____ 201 г.

Старая редакция	Новая редакция
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения ПРИМАФУНГИН® Natamycinum Регистрационный номер: Торговое название препарата: ПРИМАФУНГИН® МНН или группировочное название: натамицин Состав на 1 суппозиторий: активное вещество: натамицин - 100 мг; вспомогательные вещества: цетиловый спирт – 690 мг, сорбитан триолеат – 460 мг, полисорбат 80 – 460 мг, натрия гидрокарбонат – 69 мг, адипиновая кислота – 64 мг, основа для суппозиториев: полусинтетические глицериды (Суппоцир АМ) – достаточное	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ПРИМАФУНГИН® Natamycinum Регистрационный номер: ЛП-000411 Торговое наименование препарата: ПРИМАФУНГИН® Международное непатентованное наименование: натамицин Состав на один суппозиторий: действующее вещество: натамицин - 100 мг; вспомогательные вещества: цетиловый спирт – 690 мг, сорбитан триолеат – 460 мг, полисорбат 80 – 460 мг, натрия гидрокарбонат – 69 мг, адипиновая кислота – 64 мг, основа для суппозиториев: полусинтетические глицериды (Суппоцир

Старая редакция	Новая редакция
количество для получения суппозитория массой 2550 мг. Описание: Суппозитории цилиндрической формы, от светло-желтого до желтого или желтого с кремовым оттенком цвета. На срезе допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления. Форма выпуска Суппозитории вагинальные, 100 мг. По 3 суппозитория в контурную ячейковую упаковку из ПВХ/ПЭ пленки. По 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению в пачку картонную. Условия хранения Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Отпуск из аптек Отпускают без рецепта.	АМ) –707 мг. Описание: Суппозитории цилиндрической формы, от светло-желтого с кремовым оттенком до желтого с кремовым оттенком цвета. На срезе допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления. Форма выпуска Суппозитории вагинальные, 100 мг. По 3 суппозитория помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки ПВХ/ПЭ. По 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары подгрупп хромовый или хром-эрзац. Условия хранения В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Условия отпуска Отпускают без рецепта.

Генеральный директор
ООО «Авексима Сибирь»



Д.Г. Сосновских