

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Пилокарпин,

капли глазные, 1 %

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление», РФ

Изменение № 3

230622

Дата внесения Изменения « ____ » _____ 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Торговое название: Пилокарпин	Торговое наименование: Пилокарпин Реневал
Способ применения и дозы Закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 1-3 раза в день. Количество инстилляций может варьировать в зависимости от показаний и индивидуальной чувствительности больного. Для лечения острого приступа закрытоугольной глаукомы, в течение первого часа раствор пилокарпина закапывается по 1 капле каждые 15 мин, в течение 2-3 часов каждые 30 мин, в течение 4-6 часов каждые 60 мин и далее 3-6 раз в день, до купирования приступа. При необходимости сужения зрачка после инстилляций мидриатиков закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 2-6 раз в сутки.	Способ применения и дозы Закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 1-3 раза в день. Количество инстилляций может варьировать в зависимости от показаний и индивидуальной чувствительности больного. Для лечения острого приступа закрытоугольной глаукомы в течение первого часа раствор пилокарпина закапывается по 1 капле каждые 15 мин, в течение 2-3 часов каждые 30 мин, в течение 4-6 часов каждые 60 мин и далее 3-6 раз в день, до купирования приступа. При необходимости сужения зрачка после инстилляций мидриатиков закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 2-6 раз в сутки.

Старая редакция	Новая редакция
	Порядок работы с тубик-капельницей с клапаном:  1. Повернуть клапан и открыть тубик-капельницу (необходимо убедиться, что раствор находится в нижней части тубик-капельницы). 2. Нажать на тубик-капельницу и закапать необходимое количество препарата в глаза (глаз). 3. Надавить на клапан и закрыть тубик-капельницу после каждой процедуры. Порядок работы с тубик-капельницей с винтовой горловиной:  1. Докрутить винтовую крышку тубик-капельницы до упора. 2. Острие, находящееся под крышкой, проколёт верхушку тубик-капельницы. 3. Открыть тубик-капельницу, осторожно, не касаясь пальцами верхушки тубик-капельницы. 4. Нажать на тубик-капельницу, зафиксировав между большим и указательным пальцами одной руки. Закапать необходимое количество препарата в конъюнктивальный мешок глаза. Необходимо избегать контактов верхушки открытой тубик-капельницы с поверхностью глаза и руками. 5. Полностью закрыть винтовую крышку.


Старая редакция	Новая редакция
Особые указания Лечение необходимо проводить при регулярном контроле внутриглазного давления. Применение Пилокарпина не рекомендовано при ношении мягких контактных линз Для уменьшения всасывания в системный кровоток рекомендуется после инстилляций пережимать слезные каналы на 1-2 мин, надавливая пальцем у внутреннего угла глаза в области проекции слезного мешка. После вскрытия использовать в течение 14 суток. При наличии начальной катаракты миотический эффект может вызвать преходящее ухудшение зрения, поэтому в период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятий другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Срок годности 3 года. Не использовать по истечению срока годности, указанного на упаковке.	5. После использования плотно закрыть винтовую крышку по часовой стрелке. Особые указания Лечение необходимо проводить при регулярном контроле внутриглазного давления. Применение препарата не рекомендовано при ношении мягких контактных линз. Для уменьшения всасывания в системный кровоток рекомендуется после инстилляций пережимать слезные каналы на 1-2 мин, надавливая пальцем у внутреннего угла глаза в области проекции слезного мешка. После вскрытия использовать в течение 30 суток. При наличии начальной катаракты миотический эффект может вызвать преходящее ухудшение зрения, поэтому в период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятий другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности. После вскрытия использовать в течение 30 суток.

Старая редакция	Новая редакция
Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата: <i>Владелец регистрационного удостоверения, производитель:</i> АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление» Юридический адрес: 633621, Новосибирская обл., Сузунский р-н, рп. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18. Тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Интернет: www.pfk-obnovlenie.ru <i>Адрес места производства:</i> г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80. <i>Организация, принимающая претензии от потребителей:</i> АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление» 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: okk@pfk-obnovlenie.ru	Владелец регистрационного удостоверения Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление» Юридический адрес: 633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18. Тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Интернет: www.pfk-obnovlenie.ru Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей <i>Производитель</i> Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление» <i>Адрес места производства</i> Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80. <i>Организация, принимающая претензии от потребителей</i> Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление» 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: pretenzii@pfk-obnovlenie.ru

Директор по регистрации
АО «ПФК Обновление»



Е.В. Кустова



144878