МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-003631/10- 040621
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Пирацетам буфус,
раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 200 мг/мл

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление», РФ

Изменение № 4

Дата внесения Изменения «____» 040621 20____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Противопоказания Индивидуальная непереносимость пирацетама или производных пирролидона, а также других компонентов препарата. Хорея Гентингтона. Острое нарушение мозгового кровообращения (геморрагический инсульт). Конечная стадия почечной недостаточности (при клиренсе креатинина менее 20 мл/мин). Психомоторное возбуждение на момент назначения препарата. Детский возраст до 3 лет.	**Противопоказания** Гиперчувствительность к пирацетаму или другим производным пирролидона, а также другим компонентам препарата. Хорея Гентингтона. Острое нарушение мозгового кровообращения (геморрагический инсульт). Терминальная стадия хронической почечной недостаточности. Детский возраст до 18 лет.

Директор по регистрации
АО «ПФК Обновление» Е. В. Кустова

МЗ РФ
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0000000002
ФГБУ ЦЭСМП

135760