

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

АЛПИЗАРИН[®]**Регистрационный номер:** ЛП-000856**Торговое наименование:** Алпизарин[®]**Международное непатентованное или группировочное наименование**

Тетрагидроксиглюкопиранозилксантен

Химическое наименование

2-С-β-D- глюкопиранозидо-1,3,6,7- тетраоксиксантон.

Лекарственная форма

Мазь для наружного и местного применения.

Состав*Действующее вещество:*

Тетрагидроксиглюкопиранозилксантен – 2,0 г или 5,0 г;

(Алпизарин[®]) (в пересчете на 100 % вещество)*Вспомогательное вещество:*

вазелин – до получения 100,0 г мази

Описание

Однородная мазь светло-желтого цвета с зеленоватым оттенком или без оттенка.

Фармакотерапевтическая группа

Противовирусное средство.

АТХ: D06BB.

Фармакологические свойства

Алпизарин получают из технического мангиферина, выделяемого из листьев манго индийского – *Mangifera indica* L. семейства сумаховые – *Anacardiaceae*.

Фармакодинамика

Алпизарин обладает противовирусной активностью в отношении ДНК-содержащих вирусов: вируса простого герпеса 1 и 2 типа (*Herpes simplex*), вируса ветряной оспы (*Varicella zoster*) и опоясывающего лишая (*Herpes zoster*), цитомегаловирусов. В экспериментах *in vitro* показан ингибирующий эффект тетрагидроксиглюкопиранозилксантена в отношении вируса иммунодефицита человека.

Ингибирующее действие препарата на репродукцию вируса наиболее выражено на ранних этапах его развития.

Алпизарин обладает иммуностимулирующими свойствами в отношении клеточного и гуморального иммунитета, способностью индуцировать продукцию гамма-интерферона в клетках крови.

Алпизарин ингибирует рост грамотрицательных (*Escherichia coli*) и грамположительных (*Staphylococcus aureus*, *Mycobacterium tuberculosis*) бактерий, грибов (*Microsporum canis*) и патогенных простейших (*Entamoeba histolytica*, *Trichomonas vaginalis*). В основе механизма действия препарата лежит способность подавления активности бактериальной нуклеазы.

Алпизарин обладает умеренным противовоспалительным (противоотечным) действием.

Фармакокинетика. При наружном и/или местном применении Алпизарин практически не всасывается в системный кровоток, в связи с чем, не оказывает существенного системного действия.

Показания к применению

В составе комплексной терапии острых и рецидивирующих форм инфекционных заболеваний кожи и слизистых оболочек различной локализации (в том числе генитальной), вызванных вирусом простого герпеса; вирусных заболеваний слизистой оболочки полости рта (афтозный стоматит, красный плоский лишай); опоясывающего лишая, ветряной оспы, герпетической экземы Капоши, цитомегаловирусной инфекции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Беременность. Детский возраст до 1 года.

С осторожностью: период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Наружно, местно.

Препарат применяют наружно/местно 4-6 раз в сутки: на кожные поражения взрослым назначают 5 % мазь, детям – 2 %; на слизистые оболочки взрослым и детям – 2 % мазь. Препарат наносят тонким слоем и слегка втирают.

Терапевтический эффект препарата наиболее выражен при его назначении в начальном периоде заболевания или рецидива. Длительность лечения зависит от формы и тяжести заболевания:

- при острых и рецидивирующих формах простого герпеса экстрагенитальной локализации при единичных высыпаниях мазь наносят на очаг поражения в течение 3-5 дней. В случае распространенных высыпаний,

- а также при наличии лихорадки, лимфоаденопатии и других общих явлениях препарат применяют в течение 5-14 дней;
- при герпетической экземе Капоши и цитомегаловирусной инфекции препарат применяют в тех же возрастных дозировках в течение 7-21 дня в комплексной терапии;
 - при генитальном герпесе 2 % мазь наносят на пораженные участки от 4 до 6 раз в сутки в течение 7-10 дней;
 - при вирусных заболеваниях слизистой оболочки полости рта (афтозный стоматит) препарат наносят на пораженные участки в течение 5-15 дней, при эрозивно-язвенной форме красного плоского лишая слизистой оболочки полости рта – в течение 2-4 недель;
 - при ветряной оспе, опоясывающем лишае (опоясывающем герпесе) местно применяют мазь 2 % (детям) или 5 % (взрослым) на очаг поражения в течение 5-21 дня.

При рецидивах проводят повторные курсы лечения препаратом.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. При появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки препаратом не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При наружном использовании препарата взаимодействие с другими лекарственными препаратами не выявлено. Препарат может применяться в ком-

плексном лечении, в том числе с препаратами системного (общерезорбтивного) действия.

Особые указания

В случае распространенных высыпаний, а также при наличии лихорадки, лимфаденопатии и других общих явлениях в комплексе с мазью для местного и наружного применения применяют препарат Алпизарин в лекарственной форме таблетки.

Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и/или оператора).

Форма выпуска

Мазь для наружного и местного применения 2 % и 5 %.

По 5 г, 10 г и 20 г в тубы алюминиевые с внутренним лаковым покрытием и бушонами из полиэтилена высокого давления. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Акционерное общество «Фармцентр ВИЛАР».

Адрес: Россия, 123458, город Москва, улица Маршала Прошлякова, дом 30, этаж 2, офис 206.

Производитель / Организация, принимающая претензии потребителей

Акционерное общество «Фармцентр ВИЛАР».


Адрес места производства лекарственного препарата (производственной площадки): Россия, 117216, город Москва, улица Грина, дом 7, строение 15, строение 27, строение 29.

Тел./факс: (495) 388-47-00.

Интернет-сайт: www.vilar-plant.ru

Генеральный директор

АО «Фармцентр ВИЛАР»



В.В. Степанов