МИНЗДРАВ РОССИИ
17 0924
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Гепон
(наименование лекарственного препарата)

лиофилизат для приготовления раствора для местного и наружного применения, 1 мг, 2 мг
(лекарственная форма, дозировка)

ООО «ИММАФАРМА», Россия
(наименование производителя, страна)

ИЗМЕНЕНИЕ № 5

Дата внесения Изменения «____» 17 0924 202 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав на 1 флакон/ампулу: *Действующее вещество:* Треонил-глутамил-лизил-лизил-аргинил-аргинил-глутамил-треонил-валил-глутамил-аргинил-глутамил-лизил-глутамат (Гепон) 1 мг; 2 мг. **Форма выпуска** Лиофилизат для приготовления раствора для местного и наружного применения, 1 мг, 2 мг. По 1 мг или 2 мг препарата во флаконы стеклянные, герметично укупоренные пробками резиновыми, обжатые алюминиевыми колпачками. По 1 мг или 2 мг препарата в ампулы из нейтрального стекла. На флаконы или ампулы наклеивают этикетку. 1, 2, 3 флакона или ампулы вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную. 1 флакон или ампулу с препаратом, 1 ампулу с водой для инъекций по 5 мл вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную (комплект). 1 флакон или ампулу с препаратом, 1 ампулу с водой для инъекций по 5 мл, 1 шприц одноразовый стерильный вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную (комплект).	**Состав на 1 флакон:** *Действующее вещество:* Треонил-глутамил-лизил-лизил-аргинил-аргинил-глутамил-треонил-валил-глутамил-аргинил-глутамил-лизил-глутамат (Гепон) 1 мг; 2 мг. **Форма выпуска** Лиофилизат для приготовления раствора для местного и наружного применения, 1 мг, 2 мг. По 1 мг или 2 мг препарата во флаконы стеклянные, герметично укупоренные пробками резиновыми, обжатые алюминиевыми колпачками. На флаконы наклеивают этикетку. 1, 2 или 3 флакона вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную. 30 флаконов вместе с 10 инструкциями по медицинскому применению помещают в пачку картонную (для стационаров).

30 флаконов или ампул вместе с 10 инструкциями по медицинскому применению помещают в пачку картонную (для стационаров).	

Директор департамента регистрации
и клинических исследований ОАО «Авексима» Н. Ю. Степушина

МИНЗДРАВ РОССИИ
17 0924
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Гепон
(наименование лекарственного препарата)

лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь, 10 мг
(лекарственная форма, дозировка)

ООО «ИММАФАРМА», Россия
(наименование производителя, страна)

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

Дата внесения Изменения «____» 17 0924 202 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав на 1 флакон/ампулу: *Действующее вещество:* Треонил-глутамил-лизил-лизил-аргинил-аргинил-глутамил-треонил-валил-глутамил-аргинил-глутамил-лизил-глутамат (Гепон) 10 мг **Форма выпуска** Лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь, 10 мг. По 10 мг препарата во флаконы стеклянные, герметично укупоренные пробками резиновыми, обжатые алюминиевыми колпачками. По 10 мг препарата в ампулы из нейтрального стекла. На флаконы или ампулы наклеивают этикетку. 1, 2, 3 флакона или ампулы вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную. 1 флакон или ампулу с препаратом, 1 ампулу с водой для инъекций по 5 мл вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную (комплект). 1 флакон или ампулу с препаратом, 1 ампулу с водой для инъекций по 5 мл, 1 шприц одноразовый стерильный вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную (комплект). 30 флаконов или ампул вместе с 10 инструкциями по медицинскому	**Состав на 1 флакон:** *Действующее вещество:* Треонил-глутамил-лизил-лизил-аргинил-аргинил-глутамил-треонил-валил-глутамил-аргинил-глутамил-лизил-глутамат (Гепон) 10 мг **Форма выпуска** Лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь, 10 мг. По 10 мг препарата во флаконы стеклянные, герметично укупоренные пробками резиновыми, обжатые алюминиевыми колпачками. На флаконы наклеивают этикетку. 1, 2 или 3 флакона вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную. 30 флаконов вместе с 10 инструкциями по медицинскому применению помещают в пачку картонную (для стационаров).

применению помещают в пачку картонную (для стационаров).	

Директор департамента регистрации
и клинических исследований ОАО «Авексима» Н. Ю. Степушина