МИНЗДРАВ РОССИИ
261224
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Гепон
(наименование лекарственного препарата)

лиофилизат для приготовления раствора для местного и наружного применения, 1 мг, 2 мг
(лекарственная форма, дозировка)

ООО «ИММАФАРМА», Россия
(наименование производителя, страна)

ИЗМЕНЕНИЕ № 6

Дата внесения Изменения «____» 261224 202 г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Применяют местно, наружно. При местном применении препарата, т.е. для обработки слизистых оболочек, препарат растворяют в физиологическом растворе (0,9 % растворе натрия хлорида). При наружном применении препарата, т.е. для обработки кожи, препарат растворяют в воде для инъекций. Раствор препарата готовят непосредственно перед применением. Схематичное изображение приготовления раствора препарата Гепон представлено на рисунке 1. Способ приготовления раствора препарата: 1. Удалить защитную часть алюминиевого колпачка с резиновой пробки флакона с лекарственным препаратом. Если лекарственный препарат в ампуле, вскрыть ампулу. 2. Вскрыть ампулу с растворителем (вода для инъекций или физиологический раствор). Растворитель следует приобрести заблаговременно, если он не входит в состав вторичной упаковки. 3. Надеть иглу на одноразовый шприц (объем шприца 5 мл в случае приготовления раствора для обработки кожи; объем шприца 10 мл в случае приготовления раствора для обработки слизистых). 4. Набрать в шприц растворитель (объем	**Способ применения и дозы** Применяют местно, наружно. При местном применении препарата, т.е. для обработки слизистых оболочек, препарат растворяют в физиологическом растворе (0,9 % растворе натрия хлорида). При наружном применении препарата, т.е. для обработки кожи, препарат растворяют в воде для инъекций. Раствор препарата готовят непосредственно перед применением. Схематичное изображение приготовления раствора препарата Гепон представлено на рисунке 1. Способ приготовления раствора препарата: 1. Удалить защитную часть алюминиевого колпачка с резиновой пробки флакона с лекарственным препаратом. 2. Вскрыть ампулу с растворителем (вода для инъекций или физиологический раствор). Растворитель следует приобрести заблаговременно. 3. Надеть иглу на одноразовый шприц (объем шприца 5 мл в случае приготовления раствора для обработки кожи; объем шприца 10 мл в случае приготовления раствора для обработки слизистых). 4. Набрать в шприц растворитель (объем растворителя указан в табл. 1). 5. Проколоть иглой со шприцем

Старая редакция	Новая редакция
растворителя указан в табл. 1). 5. Проколоть иглой со шприцем резиновую пробку флакона с лекарственным препаратом и влить во флакон 2–2,5 мл растворителя. Если лекарственный препарат в ампуле, влить во вскрытую ампулу также 2–2,5 мл растворителя. 6. Не извлекая иглу, легкими колебательными движениями в течение примерно 1 минуты полностью растворить содержимое флакона (ампулы). 7. Набрать полученный раствор в шприц с остатком растворителя. Конечный объем раствора в шприце должен соответствовать объему, указанному в табл. 1. 8. Извлечь шприц вместе с иглой из флакона (ампулы), легкими колебательными движениями в течение примерно 1 минуты полностью перемешать раствор в шприце. 9. Снять иглу со шприца. 10. Использовать шприц в качестве дозирующего устройства для внутривагинальной/внутриуретральной инстилляций и смачивания марлевых салфеток при наружном применении препарата. Далее по тексту.	резиновую пробку флакона с лекарственным препаратом и влить во флакон 2–2,5 мл растворителя. 6. Не извлекая иглу, легкими колебательными движениями в течение примерно 1 минуты полностью растворить содержимое флакона. 7. Набрать полученный раствор в шприц с остатком растворителя. Конечный объем раствора в шприце должен соответствовать объему, указанному в табл. 1. 8. Извлечь шприц вместе с иглой из флакона, легкими колебательными движениями в течение примерно 1 минуты полностью перемешать раствор в шприце. 9. Снять иглу со шприца. 10. Использовать шприц в качестве дозирующего устройства для внутривагинальной/внутриуретральной инстилляций и смачивания марлевых салфеток при наружном применении препарата. Далее по тексту.

Директор департамента регистрации
и клинических исследований

Открытое акционерное общество «Авексима» * ОГРН 1117746... * Для документов (с) ЗАО «Авексима» ОАО «Авексима» * МОСКВА *

Н. Ю. Степушина