

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ХОНДРОКСИД®

Регистрационный номер

Торговое название препарата Хондроксид®

МНН или группировочное название Хондроитина сульфат

Лекарственная форма мазь для наружного применения

Состав

Активное вещество - хондроитина сульфат – 0,05 г (в пересчете на 100 % сухое вещество);
вспомогательные вещества: диметилсульфоксид (димексид), ланолин (ланолин безводный, воск шерстяной), вазелин, моноглицериды дистиллированные, вода очищенная – до 1 г.

Описание

Мазь светло-желтого цвета с запахом диметилсульфоксида.

Фармакотерапевтическая группа

Репарации тканей стимулятор

Код АТХ: M01AX25.

Фармакологическое действие

Фармакодинамика

Хондроксид® мазь обладает комбинированным действием:

- замедляет прогрессирование остеоартроза и остеохондроза;
- оказывает обезболивающее действие;
- обладает противовоспалительным действием;
- стимулирует восстановление суставного хряща;
- улучшает подвижность суставов;
- уменьшает припухлость суставов.

Благодаря оптимальному сочетанию компонентов мази отмечается взаимное усиление их обезболивающего и противовоспалительного эффектов. Применение препарата Хондроксид®, мазь позволяет снизить дозу принимаемых нестероидных противовоспалительных препаратов.

Хондроксид® содержит натуральный компонент хондроитина сульфат (высокомолекулярный мукополисахарид), который принимает участие в построении хрящевой ткани.

Хондроитина сульфат:

- улучшает фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани;
- снижает активность ферментов, разрушающих хрящевую ткань;
- тормозит процессы дегенерации (разрушения) хрящевой ткани;
- стимулирует синтез глюкозаминогликанов;
- препятствует коллапсу соединительной ткани.

Это приводит к уменьшению болезненности и увеличению подвижности пораженных суставов.

Фармакокинетика

Хондроксид® мазь хорошо всасывается. В соответствии с данными, полученными в экспериментальных исследованиях на мышцах с использованием радиомеченого 3Н-хондроитина сульфата, показатель всасываемости хондроитина сульфата составляет 14 %. Диметилсульфоксид способствует лучшему проникновению хондроитина сульфата через клеточные мембраны вглубь тканей. Хондроитина сульфат после нанесения препарата Хондроксид® мазь на кожу быстро и избирательно поступает в сустав с достижением максимальной концентрации через 30 минут и

ЛС-000640-110912

последующим двухфазным выведением препарата из хрящевой ткани. Завершение быстрой фазы выведения происходит через 1 час после применения. Время удержания препарата в суставе составляет 5 часов.

Показания к применению

Дегенеративно-дистрофические заболевания периферических суставов и позвоночника: лечение и профилактика остеоартроза, остеохондроза позвоночника.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата. Повреждение кожных покровов в области нанесения препарата.

С осторожностью

Беременность, период лактации, детский возраст (эффективность и безопасность не установлены).

Способ применения и дозы

Наружно. Мазь Хондроксид® наносят 2-3 раза в день на кожу над очагом поражения и втирают в течение 2-3 мин до полного впитывания. Курс лечения – от 2-3 недель до 2-3 месяцев. При необходимости - курс лечения повторяют.

Побочное действие

Аллергические реакции.

Передозировка

О случаях передозировки препарата Хондроксид® мазь не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

Особые указания

Следует избегать попадания препарата Хондроксид® на слизистые оболочки. Не применять препарат без консультации врача при беременности, в период лактации, в детском возрасте.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Хондроксид® мазь не вызывает седативного эффекта, психомоторных нарушений и не влияет на способность пациента заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психических и двигательных реакций.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения 5%. По 30 или 50 г в тубы алюминиевые или в тубы полиэтиленовые ламинатные. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии

ОАО «НИЖФАРМ», Россия

603950, г. Нижний Новгород


ГСП-459, ул. Салганская, 7

Тел.: (831) 278-80-88

Факс: (831) 430-72-28

Интернет: <http://www.nizhpharm.ru>

Представитель ОАО «Нижфарм»



В.А. Балабан

58309