

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Эхинацеи настойка

Регистрационный номер:

Торговое наименование

Эхинацеи настойка

Международное непатентованное или группировочное наименование

Эхинацеи пурпурной травы настойка

Лекарственная форма

Настойка

Состав

Для получения 1 л настойки необходимо:

Эхинацеи пурпурной трава – 200 г

Этанол (спирт этиловый) 40 % – до получения 1 л настойки.

Описание

Прозрачная жидкость от зеленовато-желтого до желтовато-коричневого цвета. В процессе хранения препарат может стать мутным, допускается выпадение мелкого осадка, хлопьевидного осадка, осадка, не разбивающегося при встряхивании, и образование налета на стенках флакона.

Фармакотерапевтическая группа

Иммуностимуляторы; другие иммуностимуляторы.

Код АТХ: L03AX

Фармакологические свойства

Оказывает иммуностимулирующее и противовоспалительное действие.

Фармакокинетика

Не применимо.

Показания к применению

В комплексной терапии хронических, рецидивирующих, инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей (ринит, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), прогрессирующие системные заболевания (туберкулез, лейкоз, рассеянный склероз), детский возраст до 12 лет, беременность, период грудного вскармливания.

С осторожностью

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, эпилепсия, детский возраст старше 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Препарат следует принимать внутрь взрослым и детям от 12 до 18 лет по 25-35 капель 3 раза в день до еды. Средняя продолжительность лечения 2-3 недели. Проведение повторного курса лечения возможно после консультации с врачом. Перед применением взбалтывать. Если после лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Аллергические реакции (гиперемия, отек лица, снижение артериального давления).

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы

При превышении рекомендованных доз или длительности применения настойки эхинацеи возможно развитие симптомов нарушения функционирования желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота), повышенное нервное возбуждение, расстройства сна, аллергические реакции.

Лечение

В случае появления симптомов передозировки следует прекратить применение препарата и принять немедленные меры симптоматической и поддерживающей терапии (в соответствии с клиническим состоянием больного).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Возможно уменьшение эффективности препаратов, оказывающих иммунодепрессивное действие.

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

В максимальной суточной дозе препарата содержится до 0,8 г абсолютного этилового спирта.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период применения препарата следует воздержаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Настойка.

По 25 и 50 мл во флаконы темного стекла, укупоренные пробками полимерными из полиэтилена высокого давления или полиэтилена низкого давления с уплотнительными элементами или пробками из полиэтилена высокого давления или полиэтилена низкого давления и крышками навинчиваемыми из полиэтилена высокого давления или полиэтилена низкого давления или крышками навинчиваемыми из полиэтилена высокого давления или полиэтилена низкого давления с уплотнительным элементом.

По 25 и 50 мл во флаконы стеклянные из коричневого стекла, укупоренные крышками из полиэтилена высокого давления или полиэтилена низкого давления с капельницами и без. На флаконы наклеивают этикетки.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке (в пачке) для защиты от света.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872) 41-04-73.

Производитель/Организация, принимающая претензии:

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872) 41-04-73.