МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

АЛТЕЯ СИРОП

Регистрационный номер
Торговое название препарата: Алтея сироп
Лекарственная форма: сироп.
Состав: Действующие вещества: Алтея корней экстракт сухой - 2,0 г (с содержанием сахарозы 40%, лактозы 35%, суммы восстанавливающих моносахаридов в пересчете на глюкозу - 1,0 %)
Вспомогательные вещества: сахароза – 62,72 г, натрия бензоат – 0,38 г, вода очищенная – до 100 г.
Описание: Сироп от желтоватого до желтовато-коричневого цвета, со слабым специфическим запахом.
Фармакотерапевтическая группа: Отхаркивающее средство растительного происхождения.
Код АТХ: R05CA05
Фармакологические свойства
Обладает рефлекторным отхаркивающим, а также местным противовоспалительным действием, снижает вязкость бронхиального секрета.
Показания к применению:
Заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с трудноотделяемой мокротой (трахеит, трахеобронхит, бронхит).
Противопоказания:
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.
С осторожностью
Больным сахарным диабетом и лицам, находящимся с пониженным содержанием углеводов. Перед применением препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания:
Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск доля для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.
Способ применения и дозы:
Внутрь:

Детям до 12 лет – по 1 чайной ложке сиропа, предварительно разведённой в 1/4 стакана тёплой воды, 4-5 раз в день после еды. Детям старше 12 лет и взрослым – по 1 столовой ложке сиропа, предварительно разведённой в 1/2 стакана тёплой воды, 4-5 раз в день после еды. Длительность лечения составляет 10-15 дней. Увеличение продолжительности и проведения повторных курсов лечения возможно по согласованию с врачом.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, рвота.

Лечение: отмена препарата, промывание желудка.

Указание особенностей действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене:

Без особенностей.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:

Не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания:

Больным сахарным диабетом необходимо учитывать, что в 1 чайной ложке сиропа содержится около 4,2 г сахарозы (0,35 ХЕ), в столовой ложке – около 16,8 г сахарозы (1,4 ХЕ).

Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора, и т.п.).

Форма выпуска:

Сироп. По 100, 125, 200 г в банки или флаконы оранжевого стекла или полимерные укупоренные полиэтиленовыми пробками и навинчиваемыми крышками или колпачками алюминиевыми с прокладками. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Допускается укладка флаконов (банок) в групповую упаковку (коробку картонную) с равным количеством инструкций по применению.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

1 год 6 месяцев.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек:

Без рецепта.

Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата:

ОАО «Самарамедпром», 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, д. 86

Тел.\факс (846) 373-81-07.

ОАО «Самарамедпром», 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, д.99 б.
Тел.\факс (846) 373-81-08.
446246, Самарская обл., Волжский район, пос.г.т. Петра-Дубрава, на территории завода «Коммунар», лит. Б, Б1, здание №2.
Тел.\факс (846) 373-81-09

Генеральный директор
ОАО «Самарамедпром» Н.Л. Стышнева