ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата

РИНЗА® ЛОРСЕПТ АНЕСТЕТИКС

Торговое название: РИНЗА® ЛОРСЕПТ АНЕСТЕТИКС

МНН или Группировочное название:
Амилметакрезол + Дихлорбензиловый спирт + Лидокаин

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания (апельсиновые, лимонные, медово-лимонные, черносмородиновые)

Описание:
- апельсиновые: круглые двояковыпуклые таблетки оранжевого цвета с шероховатой поверхностью. Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краев.
- лимонные: круглые двояковыпуклые таблетки желтого цвета с шероховатой поверхностью. Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краев.
- медово-лимонные: круглые двояковыпуклые таблетки от коричневато-желтого до коричневого цвета с шероховатой поверхностью. Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краев.
- черносмородиновые: круглые двояковыпуклые таблетки фиолетового цвета с шероховатой поверхностью. Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краев.

Состав:
1 таблетка содержит:
Активные вещества:
Амилметакрезол .....0,6 мг
2,4-дихлорбензиловый спирт.....1,2 мг
Лидокаина гидрохлорида моногидрат.....10,0 мг
Вспомогательные вещества: сахароза, декстроза жидкая, лимонной кислоты моногидрат, ароматизатор мятный 9Т/10448, апельсина масло, аниса масло, краситель солнечный закат желтый (для апельсиновых таблеток); сахароза, декстроза жидкая, лимонной кислоты моногидрат, мяты полевой листьев масло, лимона масла концентрат, аниса масло, краситель хинолиновый желтый (для лимонных таблеток); сахароза, декстроза жидкая, мяты полевой листьев масло, ароматизатор медовый, карамель, лимона масла эссенция, краситель солнечный закат желтый (для медово-лимонных таблеток); сахароза, декстроза жидкая, лимонной кислоты моногидрат, мяты полевой листьев масло, ароматизатор черносмородиновый, краситель азорубин, краситель бриллиантовый голубой (для черносмородиновых таблеток).

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство.

Код АТХ: R02AA20

Фармакологическое действие
Препарат оказывает антисептическое действие, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов *in vitro*, обладает антимикотическим действием. Оказывает местноанестезирующее и противоотечное действие.

Показания к применению
Симптоматическая терапия болей в горле при инфекционно – воспалительных заболеваниях полости рта и глотки.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Детский возраст (до 12 лет).

Применение при беременности и лактации
Применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно под контролем врача только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы
Местно. Взрослые и дети старше 12 лет: рассасывать по 1 таблетке каждые 2-3 часа. Максимальная суточная доза - 8 таблеток. Продолжительность курса лечения 5-7 дней.

Побочное действие
Аллергические реакции. Возможна потеря чувствительности языка (соблюдать осторожность при приеме горячей пищи и воды).

Передозировка
Возможна избыточная анестезия слизистой оболочки верхних отделов пищеварительного тракта.
Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Клинически значимого взаимодействия с лекарственными препаратами других групп не выявлено.

Особые указания
Не следует использовать препарат при наличии повышенной индивидуальной чувствительности к любому компоненту, входящему в состав препарата.
При назначении препарата пациентам с сахарным диабетом следует учитывать, что 1 таблетка содержит 0.20 хлебных единиц (ХЕ).

Влияние на способность управлять автомобилем и обслуживать движущееся механическое оборудование
Препарат не влияет на способность управлять автомобилем и обслуживать движущееся механическое оборудование.

Форма выпуска
Таблетки для рассасывания (апельсиновые, лимонные, медово-лимонные, черносмородиновые)

4 таблетки в алюминиевый стрип; 2, 3 или 4 стрипа вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

8 таблеток в блистер ал/пвх; 2 или 3 блистера вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

8 таблеток в блистер ал/пвх; 2 или 3 блистера в многослойный ламинированный пакет. 1 пакет вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Условия хранения
В сухом месте при температуре не выше 30°С.
Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности:
4 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Отпуск из аптек
Без рецепта.

Производитель:
«Юник Фармасьютикал Лабораториз»
(Отделение фирмы «Дж.Б.Кемикалс
энд Фармасьютикалс Лтд»)
Ворли, Мумбай 400 030, Индия.

® - Товарный знак

Представительство в России:
Москва 123242, ул. Садовая Кудринская, 3
Тел: (495) 254 7579, Факс: (495) 254 8382

И.О. Директора ИТЭЛ Васильев А.Н.

Глава представительства фирмы Некрасова О.В.