МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-004122/09—120816
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ГЕКСОРАЛ® ТАБС ЭКСТРА
(наименование лекарственного препарата)

таблетки для рассасывания
(апельсиновые, лимонные, медово-лимонные, черносмородиновые)
(лекарственная форма, дозировка)

«Юник Фармасьютикал Лабораториз»
(Отделение фирмы «Дж.Б.Кемикалс энд Фармасьютикалс Лтд.»),
Индия
(наименование производителя, страна)

Изменение № 4

Дата внесения изменения «____» 120816 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Раздел отсутствует	**С осторожностью** В следующих случаях ГЕКСОРАЛ® ТАБС ЭКСТРА, таблетки для рассасывания (апельсиновые, лимонные, медово-лимонные, черносмородиновые) можно применять, только тщательно взвесив пользу и риск лечения: - пациенты, страдающие эпилепсией; - пациенты с нарушением сердечной проводимости; - пациенты с повреждением печени.

Старая редакция	Новая редакция
Применение при беременности и лактации Применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно под контролем врача только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает риск для плода и ребенка.	**Применение при беременности и в период грудного вскармливания** Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только под контролем врача и только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает риск для плода и ребенка.
Особые указания Не следует использовать препарат при наличии повышенной индивидуальной чувствительности к любому компоненту, входящему в состав препарата. При назначении препарата пациентам с сахарным диабетом следует учитывать, что 1 таблетка содержит 0.20 хлебных единиц (ХЕ). Если лекарственное средство пришло в негодность или истек срок годности - не выбрасывайте его в сточные воды или на улицу! Поместите лекарственное средство в пакет и положите в мусорный контейнер. Эти меры помогут защитить окружающую среду!	**Особые указания** Не следует использовать препарат при наличии повышенной индивидуальной чувствительности к любому компоненту, входящему в состав препарата. Если симптомы заболевания ухудшаются, сохраняются или появляются новые, следует проконсультироваться с врачом. Лидокаин снижает чувствительность слизистой оболочки, что может повышать риск аспирации. Препарат содержит сахарозу, что необходимо учитывать пациентам, страдающим сахарным диабетом, а также лицам, находящимся на гипокалорийной диете. В 1 таблетке для рассасывания содержится 1618,0

Старая редакция	Новая редакция
	мг сахарозы, что соответствует 0,20 ХЕ. Хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания препарата ребенком, следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Если лекарственное средство пришло в негодность или истек срок годности - не выбрасывайте его в сточные воды или на улицу! Поместите лекарственное средство в пакет и положите в мусорный контейнер. Эти меры помогут защитить окружающую среду!
Организация, принимающая претензии ООО «Джонсон & Джонсон», Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, стр. 2, тел. (495) 726-55-55.	**Организация, принимающая претензии** ООО «Джонсон & Джонсон», Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2, тел. (495) 726-55-55.

Представитель фирмы
Специалист по регистрации

Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1037739022840 "Джонсон & Джонсон" для регистрации Москва

А.В. Адаменко