

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**Вода для инъекций, растворитель для приготовления
лекарственных форм для инъекций**

Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Уфимский витаминный завод"
(ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА"), Россия

Изменение № 1

24 01 22

Дата внесения Изменения «___» _____ 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Лекарственная форма: растворитель Фармакологические свойства <i>Фармакодинамика</i> Вода для инъекций не обладает фармакологической активностью. Используется в качестве растворителя и применяется для приготовления инфузионных и инъекционных растворов, обеспечивая оптимальные условия для совместимости и эффективности субстратов и воды. <i>Фармакокинетика</i> При введении постоянно чередующейся воды и электролитов поддержание гомеостаза осуществляется почками. Побочное действие Побочное действие определяется побочными эффектами лекарственного препарата, для растворения или разведения которого был использован растворитель. Передозировка	Лекарственная форма: растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций Фармакологические свойства <i>Фармакодинамика</i> Вода для инъекций не обладает фармакологической активностью. Используется в качестве растворителя для приготовления лекарственных форм для инъекций и применяется для приготовления инфузионных и инъекционных растворов, обеспечивая оптимальные условия для совместимости и эффективности субстратов и воды. <i>Фармакокинетика</i> При введении постоянно чередующейся воды и электролитов поддержание гомеостаза осуществляется почками. Побочное действие Побочное действие определяется побочными эффектами лекарственного препарата, для растворения или разведения которого была использована Вода для инъекций.

Старая редакция	Новая редакция
После введения больших объемов гипотонических растворов, в которых в качестве растворителя/разбавителя использовалась вода для инъекций, может развиваться гемолиз. Признаки и симптомы передозировки также будут связаны со свойствами растворенного/разбавленного лекарственного препарата. При случайной передозировке лечение должно быть прекращено, а пациент должен быть обследован на предмет выявления соответствующих признаков и симптомов, связанных с введением растворенного/разбавленного лекарственного препарата. Наблюдение за пациентом следует проводить до разрешения симптомов. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Влияние на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора) определяется свойствами лекарственного препарата, для растворения или разведения которого был использован растворитель. Форма выпуска Растворитель. По 0,7; 1, 2, 5 или 10 мл в ампулы из стекла I гидролитического класса. По 2, 4, 5 мл во флакон емкостью 5 мл или по 8, 10 мл во флакон емкостью 10 мл из стекла I	Передозировка После введения больших объемов гипотонических растворов, в которых в качестве растворителя/разбавителя использовалась Вода для инъекций, может развиваться гемолиз. Признаки и симптомы передозировки также будут связаны со свойствами растворенного/разбавленного лекарственного препарата. При случайной передозировке лечение должно быть прекращено, а пациент должен быть обследован на предмет выявления соответствующих признаков и симптомов, связанных с введением растворенного/разбавленного лекарственного препарата. Наблюдение за пациентом следует проводить до разрешения симптомов. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Влияние на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора) определяется свойствами лекарственного препарата, для растворения или разведения которого была использована Вода для инъекций. Форма выпуска Растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций. По 0,7, 1, 2, 5 или 10 мл в ампулы из стекла I гидролитического класса.

Старая редакция	Новая редакция
гидролитического класса, укупоренный колпачком комбинированным из алюминия и пластмассы с элементом эластомерным или укупоренный пробкой из эластомерного материала и колпачком комбинированным из алюминия и пластмассы. По 5 ампул помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной или из пленки полиэтилентерефталатной без фольги. 5 флаконов емкостью 5 мл помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной или из пленки полиэтилентерефталатной без фольги. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки с ампулами или с флаконами емкостью 5 мл вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. 5 флаконов емкостью 10 мл вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона с прокладками.	По 2, 4, 5 мл во флакон емкостью 5 мл или по 8, 10 мл во флакон емкостью 10 мл из стекла I гидролитического класса, укупоренный колпачком комбинированным из алюминия и пластмассы с элементом эластомерным или укупоренный пробкой из эластомерного материала и колпачком комбинированным из алюминия и пластмассы. На ампулу и флакон наклеивают самоклеящуюся этикетку. По 5 ампул помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной. 5 флаконов емкостью 5 мл помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки с ампулами или с флаконами емкостью 5 мл вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. 5 флаконов емкостью 10 мл вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
Раздел отсутствует	Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителей Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Уфимский витаминный завод" (ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА"), Россия 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 28, тел./факс: (347) 272 92 85. www.pharmstd.ru

Старая редакция	Новая редакция
Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» 450077, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, д.28, тел./факс: (347) 272 92 85, www.pharmstd.ru	Производитель Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Уфимский витаминный завод" (ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА"), Россия Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 28, тел./факс: (347) 272 92 85, www.pharmstd.ru

Представитель

ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА"



Е.В. Толстова