

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА

МИНЗДРАВ РОССИИ
210622

СОГЛАСОВАНО

Регистрационный номер:

Торговое наименование: ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА.

Международное непатентованное или группировочное наименование: водорода пероксид.

Лекарственная форма: раствор для местного и наружного применения.

Описание: бесцветная прозрачная жидкость без запаха или со слабым своеобразным запахом, смешивается с водой во всех соотношениях.

Состав: *действующее вещество:* раствора перекиси водорода от 75 до 110 г в зависимости от фактического содержания перекиси водорода в исходном препарате; *вспомогательные вещества:* натрия бензоат – 0,5 г; воды очищенной – до 1000 мл.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство.

Код АТХ: D08AX01.

Фармакологические свойства:

Обильное пенообразование способствует тромбообразованию и остановке кровотечений из мелких сосудов.

Фармакодинамика:

Антисептическое средство из группы оксидантов, обладает гемостатическим эффектом. При контакте перекиси водорода с поврежденной кожей и слизистыми оболочками высвобождается активный кислород, при этом происходит механическое очищение и инактивация органических веществ (протеины, кровь, гной).

Антисептическое действие препарата не является стерилизующим, при его применении происходит лишь временное уменьшение количества микроорганизмов.

Показания к применению:

Воспалительные заболевания слизистых оболочек, гнойные раны, капиллярное кровотечение из поверхностных ран, носовые кровотечения.

Для дезинфекции и дезодорирования: стоматит, ангина, тонзиллит, гинекологические заболевания.

Противопоказания:

Повышенная индивидуальная чувствительность.

С осторожностью:

Декомпенсированные заболевания печени и почек, гипертиреоз, герпетиформный дерматит.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания:

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы:

Наружно в виде 3 % раствора. Местно (на слизистые оболочки) в виде 0,25 % раствора. Для получения 0,25 % раствора препарат разводят водой в соотношении 1:11. Неразбавленный раствор не применять для обработки слизистых оболочек.

Поврежденные участки кожи или слизистых оболочек обрабатывают ватным или марлевым тампоном, смоченным раствором препарата или орошают струйно. Тампоны следует держать пинцетом.

Побочное действие:

Возможно чувство жжения при обработке раны, в редких случаях аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: раздражение верхних дыхательных путей (ожог, ларинго-бронхоспазм), при попадании внутрь – раздражение слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, гемолиз, гемоглобинурия, летальная доза – 3 г.

Лечение: промывание желудка 0,5 % раствором натрия тиосульфата, растворами натрия гидрокарбоната, внутривенно натрия тиосульфат 30 % - до 300 мл.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не изучалось.

Особые указания:

Не рекомендуется использовать препарат под повязки.

Препарат нельзя вводить в полости.

Следует избегать попадания в глаза! (при попадании в глаз – обильно промыть водой).

Нестабилен в щелочной среде, в присутствии щелочей металлов, сложных радикалов некоторых оксидантов, а также на свету и в тепле.

Обработка раны 3 % раствором перекиси водорода не гарантирует от заражения столбняком и др. раневой инфекцией.

3 % раствор применяют внутрь в токсикологической практике в качестве антидота (в комбинации с 3 % раствором уксусной кислоты) при отравлении калия перманганатом.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска:

Раствор для местного и наружного применения 3 %.

По 25, 40, 50 и 100 мл во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полиэтиленовыми, пробками, пробками-капельницами полимерными и крышками навинчиваемыми пластмассовыми или крышками полимерными навинчиваемыми.

По 250, 500 и 1000 мл во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полиэтиленовыми, или пробками полимерными или прокладками и крышками навинчиваемыми пластмассовыми или крышками полимерными навинчиваемыми.

По 40 мл, 50 мл, 100 мл, 500 мл и 1000 мл во флаконы полимерные, укупоренные пробками полимерными или пробками с уплотнительными элементами полимерными и крышками полимерными, или укупоренные крышками полимерными.

Каждый флакон по 25, 40, 50 и 100 мл вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Пачки помещают в гофрокоробки или упаковывают в термоусадочную пленку.

Флаконы вместе с равным количеством инструкций по применению укладывают в коробки групповой упаковки, или упаковывают в термоусадочную пленку.

20 флаконов по 250 мл вместе с 20 инструкциями по применению, 8 флаконов по 500 и 1000 мл вместе с 8 инструкциями по применению помещают в коробку из картона коробочного (для стационаров).

По 5 кг, 10 кг и 20 кг (для стационаров) в канистры полимерные из полиэтилена высокого давления или низкого давления, укупоренные навинчиваемыми пластмассовыми крышками с прокладками.

Каждая канистра сопровождается инструкцией по применению препарата, помещенной в пакет из полиэтилена.

На флаконы, пачки, коробки, канистры наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеющиеся этикетки.

Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре не ниже 8 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения:

ООО «ВЕСТ», Россия, 117218, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 25, офис 5 этаж. Тел.: +7 (495) 128-65-68.

Производитель / Организация, принимающая претензии потребителей:

ООО «Йодные Технологии и Маркетинг», Россия, 115280, г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, д. 19, этаж 1, оф. 41х1д.

Тел./факс: (495) 727-05-08, 727-05-03.

Адрес места производства:

Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 70.

или

Производитель / Организация, принимающая претензии потребителей:

ОАО «Самарамедпром», Россия, 443070, Самарская обл., г. Самара,
ул. Партизанская, д. 86. Тел./факс: (846) 373-81-07, (846) 373-81-08.

Адрес места производства:

Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 70.

Генеральный директор

ООО «ВЕСТ»



Торгомян К. Г.

143615

