

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
МАКСИСПРЕЙ

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Максиспрей

Международное непатентованное название: гексэтидин

Лекарственная форма: спрей для местного применения.

Состав на 100 мл:

Активное вещество: гексэтидин (в пересчете на 100% вещество) – 200 мг (0,2 %).

Вспомогательные вещества: натрия сахарината дигидрат, лимонной кислоты моногидрат, натрия гидроксид (натрия гидроокись), глицерол (глицерин), этанол (спирт этиловый ректификованный), лауромакрогол (макрогола лауриловый эфир), цинеол (эвкалиптол), левоментол (L-ментол), мяты перечной листьев масло, вода очищенная.

Описание: Почти бесцветная жидкость с характерным запахом ментола, находящаяся в баллоне алюминиевом с дозирующим насосом, снабженным распылителем для орального применения с защитным колпачком.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство

Код АТХ: A01AB12

Фармакологические свойства

Антисептическое средство для местного применения для нанесения на слизистые оболочки. Обладает противомикробным, противогрибковым, обезболивающим, обволакивающим и дезодорирующим действием.

Фармакокинетика

После однократного применения местное действие гексэтидина продолжается 10-12 часов. Препарат практически не всасывается с поверхности слизистых оболочек и не оказывает системного эффекта.

Показания к применению

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки (тонзиллит, в т.ч. ангина Плаута-Венсана, фарингит, стоматит, афтозные язвы полости рта, глоссит, периодонтит, гингивит, пародонтоз, пародонтопатии, альвеолит), кровоточивость десен. При ОРЗ – в качестве вспомогательного средства, в составе комплексной терапии.

Грибковые инфекции полости рта, глотки и гортани (молочница).

Травмы и оперативные вмешательства в полости рта, глотки и гортани (как до, так и после их проведения), в т.ч. профилактика инфицирования альвеол после экстракции зуба.

В качестве средства гигиены полости рта для устранения неприятного запаха (дезодорирующий эффект).

Профилактика суперинфекций при разрушающихся опухолях полости рта и гортани.

Противопоказания

Гиперчувствительность, атрофический фарингит, беременность (I триместр), детский возраст до 8 лет.

Беременность и лактация

Сведений о каких-либо неблагоприятных эффектах гексэтидина при беременности и кормлении грудью нет. В I триместре беременности применение препарата противопоказано. Перед назначением препарата беременным или кормящим женщинам необходимо тщательно взвесить

пользу лечения для матери и возможный риск для плода и ребенка, учитывая отсутствие достаточных данных о проникновении препарата через плаценту и в грудное молоко.

Способ применения и дозы

Местно, после еды или в промежутках между приемами пищи.



С помощью спрея обрабатывают пораженные участки в полости рта и глотке.

Для правильного использования препарата необходимо выполнить следующие действия:

1. Снять крышку с баллона, установить распылитель в соответствующее отверстие верхней части баллона.
2. Ввести необходимое количество препарата в полость рта, нажав 3-4 раза на распылитель. Во время введения препарата следует задержать дыхание.

Взрослым и детям старше 8 лет: частота применения - 2-3 раза в день. При необходимости возможно более частое использование препарата. Курс лечения - 5-7 дней

Во время введения баллон следует держать вертикально (см. рисунок)!



Побочное действие

Аллергические реакции; жжение слизистой оболочки полости рта; при случайном проглатывании – тошнота; при длительном применении возможно нарушение вкусовых ощущений.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили другие неблагоприятные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Гексэтидин в указанной дозировке не токсичен. Проглатывание больших количеств препарата приводит к рвоте, поэтому значительного всасывания не ожидается.

Случаев отравления этанолом при передозировке описано не было. Острое алкогольное отравление очень маловероятно, но теоретически возможно при проглатывании большой дозы препарата маленьким ребенком. При любых случаях передозировки немедленно проконсультируйтесь с врачом. Лечение симптоматическое: прием энтеросорбентов (активированного угля), промывание желудка, обильное питье. Промывание желудка необходимо в течение 2 ч после проглатывания избыточной дозы.

Особые указания.

Дети могут применять препарат с такого возраста, когда они не сопротивляются постороннему предмету (распылителю) во рту при применении спрея и способны задерживать дыхание при впрыскивании препарата.

Спрей не следует вдыхать; следует избегать попадания препарата в глаза. После применения спрея аппликатор следует ополоснуть теплой водой.

Следует иметь в виду, что спрей содержит этанол – 24-48 мг в суточной дозе.

При отсутствии общей реакции на прием препарата выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (в т.ч. управление автомобилем), не противопоказано.

Внимание! Баллон находится под давлением. Не сжигать, не прокалывать и не открывать, даже если баллон пуст.

Форма выпуска

Спрей для местного применения 0,2 %.

По 40 мл в баллоны алюминиевые (с внутренней защитой), снабженные дозирующими насосами, распылителями для орального применения с защитными колпачками.

Каждый баллон вместе с защитным колпачком, распылителем для орального применения и инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения.

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Не замораживать!

Срок годности.

2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Препарат отпускается без рецепта.

Наименование и адрес предприятия-производителя/организация, принимающая претензии:

ОАО "Фармстандарт-Лексредства",

305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, д.1а/18

Тел./факс: (4712) 34-03-13


www.pharmstd.ru

Представитель

ОАО «Фармстандарт-Лексредства»



Барыкин С.В.



63644