



ИНСТРУКЦИЯ
 по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Максиколд® Лор
 спрей для местного применения, 0,2 %

ОАО "Фармстандарт-Лексредства", Россия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « 29 04 14 » 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Фармакологические свойства Антисептическое средство для местного применения для нанесения на слизистые оболочки. Обладает противомикробным, противогрибковым, обезболивающим, обволакивающим и дезодорирующим действием. Фармакокинетика После однократного применения местное действие гексэтидина продолжается 10-12 часов. Препарат практически не всасывается с поверхности слизистых оболочек и не оказывает системного эффекта.	Фармакологические свойства <i>Фармакодинамика</i> Антисептическое средство для местного применения для нанесения на слизистые оболочки. Обладает противомикробным, противогрибковым, обезболивающим, обволакивающим и дезодорирующим действием. Противомикробное действие препарата Максиколд® Лор связано с подавлением окислительных реакций метаболизма бактерий (гексэтидин – антагонист тиамина). Препарат обладает широким спектром антибактериального и противогрибкового действия, в частности в отношении грамположительных бактерий и грибов рода <i>Candida</i>, однако препарат Максиколд® Лор может также оказывать эффект при лечении инфекций, вызванных, например, <i>Pseudomonas aeruginosa</i> или <i>Proteus</i>. В концентрации 100 мг/мл препарат подавляет большинство штаммов бактерий. Развитие

Старая редакция	Новая редакция
Противопоказания Гиперчувствительность, атрофический фарингит, беременность (I триместр), детский возраст до 8 лет. Беременность и лактация Сведений о каких-либо неблагоприятных эффектах гексэтидина при беременности и кормлении грудью нет. В I триместре беременности применение препарата противопоказано. Перед назначением препарата беременным или кормящим женщинам необходимо тщательно взвесить пользу лечения для матери и возможный риск для плода и ребенка, учитывая отсутствие достаточных данных о проникновении препарата через плаценту и в грудное молоко. Способ применения и дозы Местно, после еды или в промежутках между приемами пищи.	устойчивости не наблюдалось. Максиколд® Лор оказывает слабое анестезирующее действие на слизистую оболочку. Фармакокинетика После однократного применения местное действие гексэтидина продолжается 10-12 часов. Препарат практически не всасывается с поверхности слизистых оболочек и не оказывает системного эффекта. После однократного применения действующего вещества его следы обнаруживают на слизистой десен в течение 65 часов. В бляшках зубов активные концентрации сохраняются в течение 10-14 часов после применения. Противопоказания Гиперчувствительность, атрофический фарингит, детский возраст до 3 лет. Применение во время беременности и в период грудного вскармливания Сведений о каких-либо неблагоприятных эффектах гексэтидина при беременности и кормлении грудью нет. Перед назначением препарата беременным или кормящим женщинам врач должен тщательно взвесить пользу лечения для матери и возможный риск для плода и ребенка, учитывая отсутствие достаточных данных о проникновении препарата через плаценту и в грудное молоко. Способ применения и дозы Местно, после еды или в промежутках между приемами пищи.

Старая редакция	Новая редакция
С помощью спрея обрабатывают пораженные участки в полости рта и глотке. Для правильного использования препарата необходимо выполнить следующие действия: 1. Снять крышку с баллона, установить распылитель в соответствующее отверстие верхней части баллона. 2. Ввести необходимое количество препарата в полость рта, нажав 3-4 раза на распылитель. Во время введения препарата следует задержать дыхание. Взрослым и детям старше 8 лет: частота применения - 2-3 раза в день. При необходимости возможно более частое использование препарата. Курс лечения – 5-7 дней. Во время введения баллон следует держать вертикально (см. рисунок)!	С помощью спрея обрабатывают пораженные участки в полости рта и глотке. Для правильного использования препарата необходимо выполнить следующие действия: 1. Снять крышку с баллона, установить распылитель в соответствующее отверстие верхней части баллона. 2. При первом использовании необходимо предварительно произвести несколько кратковременных нажатий на распылитель (с целью обеспечения равномерного распыления содержимого баллона). 3. Ввести необходимое количество препарата в полость рта, нажав до упора на распылитель 3-4 раза. Во время введения препарата следует задержать дыхание. 4. После употребления снять распылитель, промыть его в проточной воде и высушить при комнатной температуре в недоступном для детей месте. 5. Хранить распылитель следует в упаковке вместе с препаратом. Взрослым и детям старше 3 лет: частота применения - 2-3 раза в день. При необходимости возможно более частое использование препарата. Курс лечения – 5-7 дней. Во время введения баллон следует держать вертикально (см. рисунок)!

Старая редакция	Новая редакция
Наименование и адрес предприятия-производителя/организация, принимающая претензии: ОАО «Фармстандарт-Лексредства», 305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18 Тел./факс: (4712) 34-03-13 www.pharmstd.ru	Наименование и адрес производителя/организация, принимающая претензии: ОАО "Фармстандарт-Лексредства", 305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18, тел./факс: (4712) 34-03-13, www.pharmstd.ru

Представитель
ОАО "Фармстандарт-Лексредства"



Е.В. Толстова