

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Максиколд® Лор
спрей для местного применения, 0,2 %

ОАО "Фармстандарт-Лексредства", Россия



Изменение № 4

14 12 16

Дата внесения Изменения « ____ » ____ 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Фармакологические свойства <i>Фармакодинамика</i> Антисептическое средство для местного применения для нанесения на слизистые оболочки. Обладает противомикробным, противогрибковым, обезболивающим, обволакивающим и дезодорирующим действием. Противомикробное действие препарата Максиколд® Лор связано с подавлением окислительных реакций метаболизма бактерий (гексэтидин – антагонист тиамина). Препарат обладает широким спектром антибактериального и противогрибкового действия, в частности в отношении грамположительных бактерий и грибов рода Candida, однако препарат Максиколд® Лор может также оказывать эффект при лечении инфекций, вызванных, например, Pseudomonas aeruginosa или Proteus. В концентрации 100 мг/мл препарат подавляет большинство штаммов	Фармакологические свойства <i>Фармакодинамика</i> Антисептическое средство для местного применения для нанесения на слизистые оболочки. Обладает противомикробным, противогрибковым, обезболивающим, обволакивающим и дезодорирующим действием. Противомикробное действие препарата Максиколд® Лор связано с подавлением окислительных реакций метаболизма бактерий (гексэтидин – антагонист тиамина). Препарат обладает широким спектром антибактериального и противогрибкового действия, в частности в отношении грамположительных бактерий и грибов рода Candida, однако препарат Максиколд® Лор может также оказывать эффект при лечении инфекций, вызванных, например, Pseudomonas aeruginosa или Proteus. В концентрации 100 мг/мл препарат подавляет большинство штаммов

Старая редакция	Новая редакция
бактерий. Развитие устойчивости не наблюдалось. Максиколд® Лор оказывает слабое анестезирующее действие на слизистую оболочку.	бактерий. Развитие устойчивости не наблюдалось. Максиколд® Лор оказывает слабое анестезирующее действие на слизистую оболочку. Препарат обладает противовирусным действием в отношении вирусов гриппа А, респираторно-синцитиального вируса (РС-вирус), вируса простого герпеса 1-го типа, поражающих респираторный тракт.
Фармакокинетика После однократного применения местное действие гексэтидина продолжается 10-12 часов. Препарат практически не всасывается с поверхности слизистых оболочек и не оказывает системного эффекта. После однократного применения действующего вещества его следы обнаруживают на слизистой десен в течение 65 часов. В бляшках зубов активные концентрации сохраняются в течение 10-14 часов после применения.	Фармакокинетика После однократного применения местное действие гексэтидина продолжается 10-12 часов. Препарат практически не всасывается с поверхности слизистых оболочек и не оказывает системного эффекта. После однократного применения действующего вещества его следы обнаруживают на слизистой десен в течение 65 часов. В бляшках зубов активные концентрации сохраняются в течение 10-14 часов после применения.
Способ применения и дозы Местно, после еды или в промежутках между приемами пищи. С помощью спрея обрабатывают пораженные участки в полости рта и глотке. Для правильного использования препарата необходимо выполнить следующие действия: 1. Снять крышку с баллона, установить распылитель в соответствующее отверстие верхней части баллона.	Способ применения и дозы Местно. <i>Взрослые и дети старше 6 лет:</i> обрабатывают пораженные участки при задержке дыхания 2 раза в сутки. <i>Дети от 3 до 6 лет:</i> применение препарата возможно после консультации с медицинским работником. Гексэтин адгезируется на слизистой оболочке и благодаря этому дает стойкий эффект. В связи с этим препарат следует

Старая редакция	Новая редакция
2. При первом использовании необходимо предварительно произвести несколько кратковременных нажатий на распылитель (с целью обеспечения равномерного распыления содержимого баллона). 3. Ввести необходимое количество препарата в полость рта, нажав до упора на распылитель 3-4 раза. Во время введения препарата следует задержать дыхание. 4. После употребления снять распылитель, промыть его в проточной воде и высушить при комнатной температуре в недоступном для детей месте. 5. Хранить распылитель следует в упаковке вместе с препаратом. Взрослым и детям старше 3 лет: частота применения - 2-3 раза в день. При необходимости возможно более частое использование препарата. Курс лечения – 5-7 дней. Во время введения баллон следует держать вертикально (см. рисунок)!	применять после еды. Общие рекомендации по введению. Препарат распыляют в полости рта или глотке. С помощью спрея можно легко и быстро обработать пораженные участки. Необходимо выполнить следующие действия: 1. Снять крышку с баллона, установить распылитель в соответствующее отверстие верхней части баллона. 2. При первом использовании необходимо предварительно произвести несколько кратковременных нажатий на распылитель (с целью обеспечения равномерного распыления содержимого баллона). 3. Ввести необходимое количество препарата в полость рта, нажав до упора на распылитель 3-4 раза. Во время введения препарата следует задержать дыхание. 4. После употребления снять распылитель, промыть его в проточной воде и высушить при комнатной температуре в недоступном для детей месте. 5. Хранить распылитель следует в упаковке вместе с препаратом. Во время введения баллон следует держать вертикально (см. рисунок)!   Курс лечения – 5-7 дней. При необходимости более длительного

