

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Максиколд® Лор
спрей для местного применения, 0,2 %

ОАО "Фармстандарт-Лексредства", Россия

Изменение № 9

Дата внесения Изменения « ____ » _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав на 100 мл. <i>Действующее вещество:</i> гексэтидин (в пересчете на 100 % вещество) – 200 мг (0,2 %). <i>Вспомогательные вещества:</i> натрия сахарината дигидрат – 40 мг, лимонной кислоты моногидрат – 70 мг, натрия гидроксид (натрия гидроокись) – 19 мг, глицерол (глицерин) – 17000 мг, этанол (спирт этиловый) 95 % – 4000 мг, лауромакрогол (макрогола лауриловый эфир) – 1500 мг, цинеол (эвкалиптол) – 20 мг, левоментол (L-Ментол) – 20 мг, мяты перечной листьев масло – 10 мг, вода очищенная – до 100,0 мл.	Состав на 100 мл. <i>Действующее вещество:</i> гексэтидин (в пересчете на 100 % вещество) – 200 мг (0,2 %). <i>Вспомогательные вещества:</i> натрия сахарината дигидрат – 40 мг, лимонной кислоты моногидрат – 70 мг, натрия гидроксид (натрия гидроокись) – 19 мг, глицерол (глицерин) – 17000 мг, этанол (спирт этиловый) 95 % – 4000 мг, лауромакрогол (макрогола лауриловый эфир) – 1500 мг, цинеол (эвкалиптол) – 20 мг, левоментол – 20 мг, мяты перечной листьев масло – 10 мг, вода очищенная – до 100,0 мл.

Представитель
АО "Отисифарм"

А.К. Гололобов