МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

МИНЗДРАВ РОССИИ
020922
СОГЛАСОВАНО

Хиксозид
наименование лекарственного препарата

лиофилизат для приготовления раствора для внутриплеврального введения и ингаляций, 100 мг + 250 мг
лекарственная форма, дозировка

ООО Фирма «ФЕРМЕНТ», Россия
наименование производителя, страна

Изменение № 5

020922

Дата внесения Изменения «____» _____ 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Лекарственная форма. Лиофилизат для приготовления раствора для внутриплеврального введения и ингаляций.	**Лекарственная форма.** Лиофилизат для приготовления раствора для внутриполостного введения и ингаляций.
Способ применения и дозы. Внутриплеврально, ингаляционно. Содержимое флакона перед введением растворяют в воде для инъекций (10 мл). ингаляции проводятся с использованием ингалятора. *Внутриплеврально* (больные с эмпиемой плевральной полости): пациентам с массой тела до 40 кг – 2 мл, 40-50 кг – 8 мл, при массе 60 кг и более – 10 мл. Препарат вводят 1 раз в сутки, после приема пищи. *Ингаляционно:* пациентам с массой тела 30-40 кг – 5 мл, 40-50 кг – 8 мл, 60 кг и более – 10 мл. Препарат вводят ежедневно, 1 раз в сутки, после приема пищи. Продолжительность курса лечения – 16-21 день.	**Способ применения и дозы.** Внутриполостно, ингаляционно. Содержимое флакона перед введением растворяют в воде для инъекций (10 мл). ингаляции проводятся с использованием ингалятора. *Внутриполостно* (больные с эмпиемой плевральной полости): пациентам с массой тела до 40 кг – 2 мл, 40-50 кг – 8 мл, при массе 60 кг и более – 10 мл. Препарат вводят 1 раз в сутки, после приема пищи. *Ингаляционно:* пациентам с массой тела 30-40 кг – 5 мл, 40-50 кг – 8 мл, 60 кг и более – 10 мл. Препарат вводят ежедневно, 1 раз в сутки, после приема пищи. Продолжительность курса лечения – 16-21 день.

Старая редакция	Новая редакция
Дополнительно при обоих случаях введения назначается изониазид (внутрь или внутривенно в суточной дозе 10 мг/кг), пиридоксин (витамин B_6) 30 мг 2 раза в сутки после еды. Назначение других противотуберкулезных препаратов зависит от характера туберкулезного процесса и характера лекарственной устойчивости. **Форма выпуска** Лиофилизат для приготовления раствора для внутриплеврального введения и ингаляций 100 мг + 250 мг. По 350 мг (100 мг + 250 мг) препарата во флаконы темного (оранжевого) стекла. Флаконы укупоривают пробками резиновыми, обжатые алюминиевыми колпачками. По 1 флакону с инструкцией по применению в пачку из картона. По 10 флаконов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона со вкладышем.	Дополнительно при обоих случаях введения назначается изониазид (внутрь или внутривенно в суточной дозе 10 мг/кг), пиридоксин (витамин B_6) 30 мг 2 раза в сутки после еды. Назначение других противотуберкулезных препаратов зависит от характера туберкулезного процесса и характера лекарственной устойчивости. **Форма выпуска** Лиофилизат для приготовления раствора для внутриполостного введения и ингаляций 100 мг + 250 мг. По 350 мг (100 мг + 250 мг) препарата во флаконы темного стекла. Флаконы укупоривают пробками резиновыми, обжатые алюминиевыми колпачками. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в пачку из картона. По 10 флаконов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона с вкладышем.

Генеральный директор
ООО «Мир-Фарм» И.Х. Исмагилов