

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**Тригидросоль®**

**Регистрационный номер:** ЛП-001981

**Торговое наименование:** Тригидросоль®

**Международное непатентованное или группировочное наименование:**  
Декстроза + Калия хлорид + Натрия хлорид + Натрия цитрат&

**Лекарственная форма:** порошок для приготовления раствора для приема внутрь.

**Состав на один пакет:** калия хлорид - 1,25 г, натрия хлорид - 1,75 г, декстроза - 5,00 г, натрия цитрата дигидрат – 1,45 г [в пересчете на натрия цитрат – 1,27г].

В растворе, полученном при растворении Тригидросоли®, содержатся следующие концентрации действующих веществ:

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Калия хлорид            | 33,5 ммоль/л |
| Натрия хлорид           | 59,8 ммоль/л |
| Натрия цитрата дигидрат | 9,8 ммоль/л  |
| Декстроза               | 55,5 ммоль/л |
| Na <sup>+</sup>         | 89,5 ммоль/л |
| K <sup>+</sup>          | 34 ммоль/л   |
| Cl <sup>-</sup>         | 94 ммоль/л   |
| Цитрат                  | 9,8 ммоль/л  |

**Описание:** гранулированный порошок белого цвета без запаха. Допускается наличие кристаллов и легко рассыпающихся комков.

**Фармакотерапевтическая группа:** регидратирующее средство для перорального приема.

**Код АТХ:** А07СА

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика.** Лекарственный препарат Тригидросоль® применяется для

коррекции потери электролитов и жидкости при диарее. Декстроза содействует абсорбции электролитов, что способствует коррекции метаболического ацидоза.

Осмолярность раствора составляет 282 мосм/л, рН – 8,2.

*Фармакокинетика.* Фармакокинетические свойства воды, электролитов и декстрозы, входящих в состав препарата, сходны с таковыми, содержащимися в организме человека.

### **Показания к применению**

Пероральная регидратация и профилактика дегидратации при дегидратации легкой и средней степени, обусловленной острой диареей, с целью восполнения потерь воды и электролитов.

### **Противопоказания**

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

Тяжелое обезвоживание.

Кома (бессознательное состояние).

Кишечная непроходимость.

Тяжелая рвота.

Диарея, обусловленная холерой.

Глюкозо-галактозная мальабсорбция.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

В рекомендуемых дозах препарат может использоваться при беременности и лактации.

### **Способ применения и дозы**

Содержимое одного пакетика растворяют в 0,5 л свежеекипяченной охлажденной питьевой воды. Образующийся бесцветный раствор принимают внутрь (перорально). При необходимости раствор допускается вводить через назогастральный зонд (в условиях стационара).

Приготовленный раствор должен храниться в холодильнике (при температуре от +2 до +8 °С), его следует употребить в течение 24 часов. Чтобы не нарушать действие препарата, в раствор не следует добавлять никакие другие компоненты.

Перед началом лечения пациента следует взвесить, чтобы оценить потерю массы тела и степень дегидратации.



Питание пациента или грудное вскармливание во время проведенной пероральной регидрационной терапии прерывать не следует, или они должны быть продолжены сразу же после проведения регидратации. Во время лечения препаратом рекомендуется избегать приема пищи, богатой жирами и простыми углеводами (это может усугубить диарею).

Для предотвращения обезвоживания применение препарата Тригидросоль® следует начинать, как только началась диарея. Обычно препарат требуется применять не более 3-4 дней, лечение прекращается с окончанием диареи.

Если возникла тошнота или рвота, раствор желательно принимать в охлажденном виде небольшими порциями (например, чайными ложками).

### **Восполнение жидкости**

Для восполнения жидкости Тригидросоль® принимают в течение первых 6-10 часов в количестве, которое вдвое превышает потерю массы тела, вызванную диареей. Например, если потеря массы тела составляет 400 г, объем раствора Тригидросоль® составляет 800 мл. В течение этой фазы применение других жидкостей не требуется. Принимать пищу в первые 4 часа восполнения жидкости не рекомендуется. При приеме больших объемов возможно возникновение рвоты.

### **Профилактика обезвоживания**

Если диарея продолжается, после коррекции дегидратации желательно принимать Тригидросоль® и воду в течение 24 часов по следующей схеме:

| Масса тела<br>(кг) | Общее количество<br>требуемой жидкости<br>(л) | Тригидросоль®<br>(мл) | Вода<br>(мл) | Другие<br>жидкости<br>(мл) |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|
| 40 - 49            | 2,10                                          | 900                   | 540          | 660                        |
| 50 - 59            | 2,30                                          | 1000                  | 600          | 700                        |
| 60 - 69            | 2,50                                          | 1100                  | 660          | 740                        |
| 70 - 79            | 2,70                                          | 1200                  | 720          | 780                        |
| 80 - 89            | 3,20                                          | 1400                  | 800          | 1000                       |
| 90 - 99            | 3,60                                          | 1500                  | 900          | 1200                       |
| 100 и более        | 4,00                                          | 1700                  | 1000         | 1300                       |

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарата только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

### **Побочное действие**

У пациентов с нормальной функцией почек риск развития гипернатриемии (повышения содержания натрия в крови) или избыточного поступления воды низкий. При слишком быстром приеме возможно возникновение рвоты.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### **Передозировка**

При введении большого объема или высококонцентрированного раствора препарата Тригидросоль® (при нарушении правил приготовления раствора) может возникнуть гипернатриемия (повышение содержания натрия в крови).

Симптомы гипернатриемии включают в себя слабость, нервно-мышечное возбуждение, сонливость, спутанность сознания, кому, иногда даже остановку дыхания. У пациентов со сниженной функцией почек может возникнуть гиперкалиемия (повышение содержания калия в крови), проявляющаяся нарушением ритма сердца, слабость.

При возникновении симптомов передозировки необходимо обратиться к врачу. Коррекция водно-электролитного баланса должна проводиться на основании данных лабораторных исследований.

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Не изучалось. Раствор препарата имеет слабощелочную реакцию, поэтому может влиять на лекарственные препараты, всасывание которых зависит от pH содержимого кишечника. Диарея сама по себе может изменять всасывание многих лекарственных препаратов, которые абсорбируются в тонкой или толстой кишке, или препаратов, в метаболизме которых имеет место кишечно-печеночная рециркуляция.



## Особые указания

У детей следует применять другие растворы с более низким содержанием натрия и осмолярностью.

Учитывая состав лекарственного препарата, следует соблюдать осторожность у пациентов с сахарным диабетом, нарушением функции печени или почек, а также у пациентов, соблюдающих диету с низким содержанием соли (натрия и (или) калия).

У пациентов с сахарным диабетом, почечной недостаточностью и некоторыми другими хроническими заболеваниями диарея может вызывать существенное нарушение поддержания баланса жидкости или глюкозы. В связи с этим лечение диареи у таких пациентов может потребовать лабораторного контроля и госпитализации.

Если потребность пациента в дополнительном введении электролитов не подтверждена лабораторными исследованиями, рекомендуемые дозы препарата превышать не следует.

Тяжелое обезвоживание (потеря массы тела  $> 10\%$ , прекращение выделения мочи) следует лечить с помощью внутривенных препаратов для регидратации, после чего допускается начать применение раствора Тригидросоль®.

При необходимости внутривенного введения препаратов или при тяжелом обезвоживании или тяжелой рвоте, при снижении или прекращении выделения мочи применять Тригидросоль® следует с осторожностью.

При рвоте подождать 10 минут после завершения приступов рвоты и дать выпить раствор медленно, небольшими глотками.

Пациенту следует обратиться к врачу, если во время применения препарата Тригидросоль® у него возникают следующие ситуации:

- возникает замедленная речь, раздражительность, быстрое утомление, сонливость, ступор;
- температура повышается выше  $39^{\circ}\text{C}$ ;
- крованистый стул;
- непрекращающаяся рвота;
- диарея длится более 2 дней;
- сильные боли в животе.

Применение раствора Тригидросоль® в целях восполнения потери солей при диарее, развивающейся при холере и ряде других тяжелых кишечных инфекций, может быть недостаточно.

Лицам с почечной недостаточностью или находящимся на диете с низким содержанием калия следует учитывать, что в составе препарата содержится калий.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Препарат Тригидросоль® не влияет на способность управлять транспортными средствами и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Форма выпуска**

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь.

По 9,45 г в термосвариваемые пакеты из материала упаковочного комбинированного.

По 10 или 20 пакетов вместе с инструкцией по применению помещают в пачки из картона для потребительской тары.

### **Условия хранения**

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

2 года. Не применять по истечении срока годности.

### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Владелец регистрационного удостоверения /Производитель/**

**Предприятие, принимающее претензии**


ОАО «Марбиофарм»,

424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 121,

тел.: (8362) 42-03-12, факс: (8362) 45-00-00

**Генеральный директор**

**ОАО «Марбиофарм»**



**Д.Е. Генералов**

108 145