

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

СТИЗАМЕТ®
наименование лекарственного препарата

Регистрационное удостоверение:

Торговое название препарата: Стизамет®

Международное непатентованное название: диоксометилтетрагидропиримидин.

Лекарственная форма: мазь для местного и наружного применения.

Состав: *активное вещество:* диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) 3,0 г,
вспомогательные вещества: парафин жидкий (вазелиновое масло) 10,0 г, воск
эмульсионный 6,0 г, глицерол (глицерин) 10,0 г, этанол (спирт этиловый) 95 % 10,0 г, вода
очищенная до 100,0 г.

Описание: однородная мазь белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: репарации тканей стимулятор.

Код АТХ: (D11AX).

Фармакологические свойства

Стизамет® оказывает противовоспалительное действие, стимулирует регенерацию кожи и уменьшает вероятность нагноения. Препарат усиливает синтез внутриклеточных белков и нуклеиновых кислот, активизирует фибробластическую реакцию в дерме. Стизамет® обладает также фотозащитным действием.

Фармакокинетика

Благодаря эмульсионной основе Стизамет® легко проникает в кожу. При нанесении на кожу максимальная концентрация метилурацила в крови достигается через 2 часа, период полувыведения составляет 5,1 часа.

Показания к применению

Воспалительные заболевания кожи (экзема, нейродермит, дерматиты), плохо заживающие раны, ожоги (термические, химические, лучевые в репаративной стадии), эрозии и язвы кожи (в том числе после лучевой терапии), трофические язвы, пролежни, трещины кожи заднего прохода и молочных желез. Может использоваться с профилактической целью для предупреждения реакций кожи при облучении

новообразований с невысокой радиочувствительностью, уменьшения радиоэпителиита и поздних сращений стенок (окклюзий) влагалища – в случае лучевой терапии новообразований гениталий. Применяется также как фотозащитное средство при фотодерматозах.

Противопоказания

Гиперчувствительность, острые и хронические формы лейкозов и другие злокачественные заболевания системы органов кроветворения, избыточность грануляций в ране.

С осторожностью

С осторожностью использовать при кожных заболеваниях, сопровождающихся образованием избыточных разрастаний ткани: вегетирующей пузырчатке, вегетирующей пиодермии, веррукозной форме красного плоского лишая, веррукозной эпидермодисплазии и др., избыточных грануляциях в ране и язвах, при острых воспалительных заболеваниях кожи и в период обострения хронических. Препарат следует также применять с осторожностью на больших по площади участках кожи при нарушениях обмена холестерина и тяжелых заболеваниях печени. При радиоэпителиите и поздних лучевых повреждениях влагалища мазь используется на рыхлых тампонах в виде аппликаций.

Применение при беременности и лактации

Возможно.

Способ применения и дозы

Наружно, местно. Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 2 раза в день, при эрозиях, язвах и ранах – после предварительной обработки антисептиками. При радиоэпителиите и поздних лучевых повреждениях влагалища мазь используется на рыхлых тампонах в виде аппликаций. Разовая доза из расчета площади обрабатываемой поверхности кожи составляет от 1 до 10 г мази. Курс лечения – до полного заживления. При хронических заболеваниях длительность курса – до 2 мес. Курсовая доза может составлять 60-80 г и более (до 300 г).

Побочные эффекты

Редко аллергические реакции, кратковременное жжение.

Передозировка

Не выявлена.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Можно назначать одновременно с другими дерматотропными средствами, в том числе с глюкокортикостероидами, антибактериальными и антисептическими средствами для наружного применения.

Особые указания

Препарат не влияет на способность управлять автомобилем и выполнять работы, требующие повышенной концентрации внимания.

Форма выпуска

Мазь для местного и наружного применения 3%.

Алюминиевые тубы по 10, 15, 20 или 35 г. Тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре от 2 до 8 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Замораживания не допускать.

Срок годности

2 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения и Производитель:

ЗАО «Ретиноиды», Россия

111123, г. Москва, ул. Плеханова, д.2/46, строение 5,

тел/факс: (495) 684-21-87, (495) 234-61-18

www.retinoids.ru

Претензии потребителей направлять в адрес производителя.

Представитель ЗАО «Ретиноиды»,
д-р мед. наук

С. И. Альбанова



В.И. Альбанова