МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Назоксивир

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-007420-170921
СОГЛАСОВАНО

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Назоксивир

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин.

Лекарственная форма: мазь назальная.

Состав

100 г мази содержит:

Действующее вещество:

Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин (оксолин)	- 0,25 г.

Вспомогательные вещества:

Парафин жидкий	- 0,5 г.
Вазелин	- до 100 г.

Описание:

Однородная мазь от белого до светло-желтого цвета. При хранении допускается появление розового оттенка.

Фармакотерапевтическая группа:

Противовирусное средство для местного применения.

Код АТХ: J05AX

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Обладает противовирусной активностью, блокируя места связывания вируса гриппа (преимущественно А2) с поверхностью клеточной мембраны, защищает клетки от проникновения в них вируса.

Фармакокинетика

При нанесении на слизистую оболочку всасывается до 20 % препарата. В организме не кумулирует и выводится в основном почками в течение суток.

Показания к применению:

Профилактика гриппа, лечение вирусных ринитов.

130435

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-007420-170921
СОГЛАСОВАНО

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к диоксотетрагидрокситетрагидронафталину и другим компонентам препарата.

С осторожностью:

Беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до двух лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания:

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы:

Местно.

Для профилактики гриппа: полоской мази от 3 до 5 мм смазывают ежедневно 2-3 раза в день слизистую оболочку носа в период подъема и максимального развития эпидемической вспышки гриппа (на протяжении 25 дней) или при контакте с больным гриппом.

Лечение вирусного ринита: полоской мази от 3 до 5 мм смазывают слизистую оболочку носа 2-3 раза в день в течение 3-4 дней.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие:

Быстропроходящее чувство жжения слизистой оболочки носа, ринорея. В редких случаях возможно синее окрашивание слизистой оболочки носа.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка:

Случаи передозировки не описаны.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:

Не изучалось.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:

Применение препарата не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (работа диспетчера, управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

130135

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-007420-170921
СОГЛАСОВАНО

Форма выпуска:

Мазь назальная, 0,25 %.

По 10, 15, 25 г в тубы алюминиевые укупоренные колпачками полиэтиленовыми или в тубы алюминиевые укупоренные колпачками-бушонами полиэтиленовыми.

По 10, 15, 25 г в банки стеклянные для лекарственных средств или в банки стеклянные из коричневого стекала укупоренные крышками полиэтиленовыми натягиваемыми.

На банки наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей, или этикетки из бумаги самоклеящейся.

Каждую тубу, банку вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары или из картона хром-эрзац.

Условия хранения:

При температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения:

Общество с ограниченной ответственностью «Женел РД», Россия, 249717, Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 70

Производитель:

ОАО «Самарамедпром», Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 99Б.

Организация, принимающая претензии от потребителей:

ОАО «Самарамедпром», 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, д. 86. Тел./факс: (846) 373-81-07, (846) 373-81-08.

Генеральный директор
ООО «Женел РД» Воинова А. Д.

ООО «ЖЕНЕЛ РД» GENEL RD

ФГБУ МЗ РФ ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 НМДЭЦ

130435