МИНЗДРАВ РОССИИ
290825
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Гриппферон®

наименование лекарственного препарата

спрей назальный дозированный, 500 МЕ/доза

лекарственная форма, дозировка

ООО «Фирн М», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 9

Дата внесения изменения «____» 290825 20__г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы При первых признаках заболевания Гриппферон® применяют в течение 5 дней: • в возрасте от 0 до 1 года впрыскивают по 1 дозе (500 МЕ) в каждый носовой ход 5 раз в день (разовая доза 1000 МЕ, суточная доза 5000 МЕ); • в возрасте от 1 до 3 лет впрыскивают по 2 дозы в каждый носовой ход 3-4 раза в день (разовая доза 2000 МЕ, суточная доза 6000-8000 МЕ); • в возрасте от 3 до 14 лет впрыскивают по 2 дозы в каждый но-	**Способ применения и дозы** При первых признаках заболевания Гриппферон® применяют в течение 5 дней: • в возрасте от 0 до 1 года впрыскивают по 1 дозе (500 МЕ) в каждый носовой ход 5 раз в день (разовая доза 1000 МЕ, суточная доза 5000 МЕ); • в возрасте от 1 до 3 лет впрыскивают по 2 дозы в каждый носовой ход 3-4 раза в день (разовая доза 2000 МЕ, суточная доза 6000-8000 МЕ); • в возрасте от 3 до 14 лет впрыскивают по 2 дозы в каждый но-

Старая редакция	Новая редакция
совой ход 4-5 раз в день (разовая доза 2000 МЕ, суточная доза 8000-10000 МЕ); • с 15 лет и взрослым впрыскивают по 3 дозы в каждый носовой ход 5-6 раз в день (разовая доза 3000 МЕ, суточная доза 15000-18000 МЕ). С целью профилактики ОРВИ и гриппа: • при контакте с больным и/или при переохлаждении препарат впрыскивают в разовой возрастной дозировке 2 раза в день; • при сезонном повышении заболеваемости препарат впрыскивают в возрастной дозировке однократно утром с интервалом 24-48 часов; • при необходимости профилактические курсы повторяют. Для введения препарата следует снять защитный колпачок, ввести распылительное устройство в носовой ход и сильно нажать на распылительный механизм (1 доза – 1 нажатие). Перед первым применением следует несколько раз нажать	совой ход 4-5 раз в день (разовая доза 2000 МЕ, суточная доза 8000-10000 МЕ); • с 15 лет и взрослым впрыскивают по 3 дозы в каждый носовой ход 5-6 раз в день (разовая доза 3000 МЕ, суточная доза 15000-18000 МЕ). С целью профилактики ОРВИ и гриппа: • при контакте с больным и/или при переохлаждении препарат впрыскивают в разовой возрастной дозировке 2 раза в день; • при сезонном повышении заболеваемости препарат впрыскивают в возрастной дозировке однократно утром с интервалом 24-48 часов; • при необходимости профилактические курсы повторяют. Для введения препарата следует снять защитный колпачок, ввести распылительное устройство в носовой ход и сильно нажать на распылительный механизм (1 доза – 1 нажатие). Перед первым применением следует несколько раз нажать

Старая редакция	Новая редакция
на распылительный механизм до появления облачка спрея. Если через 5 дней лечения улучшение не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, который указаны в инструкции.	на распылительный механизм до появления облачка спрея. Если через 5 дней лечения улучшение не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.
Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителя ООО «Фирн М», 108804, г. Москва, вн.тер.г. пос. Кокошкино, дп. Кокошкино, ул. Дзержинского, д. 4А Тел.: 8 (495) 956-15-43	**Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителя** ООО «Фирн М», 108804, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Внуково, дп. Кокошкино, ул. Дзержинского, д. 4А Тел.: 8 (495) 956-15-43

Генеральный директор Н.Е. Кириллов