МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ИНГАРОН®

лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения 100000 МЕ

ООО «НПП «Фармаклон», Россия




Изменение №2

Дата внесения Изменения «____» 160321 20___ г.



Старая редакция	Новая редакция
Показания к применению Профилактика и лечение (в составе комплексной терапии) гриппа. Профилактика и лечение (в составе комплексной терапии) гриппа H_5N_1 и H_1N_1.	**Показания к применению** Профилактика и лечение (в составе комплексной терапии) гриппа и ОРВИ. Профилактика и лечение (в составе комплексной терапии) гриппа H_5N_1 и H_1N_1.
Способ применения и дозы *Интраназально.* Содержимое флакона растворяют в 5 мл воды для инъекций. При первых признаках заболевания гриппом, ОРВИ по 2 капли в каждый носовой ход после туалета носовых ходов 5 раз в день в течение 5 - 7 дней. Для профилактики ОРВИ и гриппа при контакте с больным и/или при переохлаждении 2 – 3 капли в каждый носовой ход через день за 30 минут до завтрака в течение 10 дней.	**Способ применения и дозы** *Интраназально.* Содержимое флакона растворяют в 5 мл воды для инъекций. При первых признаках заболевания гриппом, ОРВИ по 2 капли в каждый носовой ход после туалета носовых ходов 5 раз в день в течение 5 - 7 дней. Для одного курса терапии необходимо два флакона лекарственного препарата. Для профилактики ОРВИ и гриппа при контакте с больным и/или при переохлаждении 2 – 3 капли в каждый носовой ход через день


131671

Старая редакция	Новая редакция
В случае необходимости профилактические курсы повторяют. При однократном контакте достаточно одного закапывания. После закапывания рекомендуется помассировать пальцами крылья носа в течение нескольких минут для равномерного распределения препарата в носовой полости.	за 30 минут до завтрака в течение 10 дней. При однократном контакте достаточно одного закапывания. Для одного курса профилактики ОРВИ и гриппа достаточно одного флакона лекарственного препарата. В случае необходимости профилактические курсы повторяют. После закапывания рекомендуется помассировать пальцами крылья носа в течение нескольких минут для равномерного распределения препарата в носовой полости. Если по окончании курса профилактики или лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. *Инструкция по приготовлению раствора препарата* 1. Аккуратно потяните за пластиковую насадку на стеклянном флаконе, следуя направлению стрелок на алюминиевой защите.

Старая редакция	Новая редакция
	 2. Пластиковая крышка вместе с частью алюминиевой защиты снимется.  3. Круговым движением снимите оставшуюся часть алюминиевой защиты. Снимите резиновую пробку со стеклянного флакона. 

131671

Старая редакция	Новая редакция
	4. Откройтефлаконсводойдляинъекции, отломивеговерхнюючасть.  5. Влейте 5 мл воды для инъекций в стеклянный флакон с сухим веществом.  6. Извлеките крышку-капельницу из упаковки, и закрепите ее на горлышке флакона. Перед употреблением взболтайте.

Старая редакция	Новая редакция
	 Из-за необходимости хранения активного вещества в полном вакууме алюминиевая крышка должна быть герметичной и прочной. Медленно снимайте алюминиевую защиту флакона, избегайте порезов. Если крышка откололась во время снятия, можно убрать остальную часть металлического колпачка с помощью ножниц.
Побочное действие Не отмечено.	**Побочное действие** Не отмечено. Если Вы заметили любые побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу или производителю.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами Фармацевтическое взаимодействие: недопустимо смешение лиофилизата или готового раствора для интраназального введения Ингарон с другими порошками, растворами или растворителями (за исключе-	**Взаимодействие с другими лекарственными средствами** Фармацевтическое взаимодействие: недопустимо смешение лиофилизата или готового раствора для интраназального введения Ингарон® с другими порошками, растворами или растворителями (за исключением воды

131671

Старая редакция	Новая редакция
нием воды для инъекций) в одном флаконе во избежание потери активности действующего вещества.	для инъекций) в одном флаконе во избежание потери активности действующего вещества. Если Вы применяетедругие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препаратаИнгарон®, проконсультируйтесь с врачом.
Раздел отсутствует.	**Особые указания.** Не превышать максимальные рекомендованные дозы при самостоятельном применении препарата. В случае отсутствия уменьшения или утяжеления симптомов заболевания рекомендуется обратиться к врачу.
Влияние лекарственного препарата на способность управления транспортными средствами, механизмами Не изучалось.	**Влияние лекарственного препарата на способность управления транспортными средствами, механизмами** Специальных клинических исследований влияния препарата на способность управлять транспортом, механизмами не проводилось. Влияние препарата на способность выполнять виды деятельности, требующие концентрации внимания и быстроты психомоторных функций, маловероятно.

Генеральный директор А.И. Саулин
ООО «УК Фармаклон»-
управляющей организации ООО «НПП «Фармаклон»

ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 0000000005

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Фармаклон" для документов

131671