МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ИНГАРОН®



лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения 100000 МЕ







ООО «НПП «Фармаклон», Россия





Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» 010621 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы *Интраназально.* Содержимое флакона растворяют в 5 мл воды для инъекций. При первых признаках заболевания гриппом, ОРВИ по 2 капли в каждый носовой ход после туалета носовых ходов 5 раз в день в течение 5 - 7 дней. Для одного курса терапии необходимо два флакона лекарственного препарата. Для профилактики ОРВИ и гриппа при контакте с больным и/или при переохлаждении 2 – 3 капли в каждый носовой ход через день за 30 минут до завтрака в течение 10 дней. При однократном контакте достаточно одного закапывания. Для одного курса профилактики ОРВИ и гриппа достаточно одного флакона лекарственного препарата. В случае необходимости профилактические	**Способ применения и дозы** *Интраназально.* Содержимое флакона растворяют в 5 мл воды для инъекций. При первых признаках заболевания гриппом, ОРВИ по 2 капли в каждый носовой ход после туалета носовых ходов 5 раз в день в течение 5 - 7 дней. Для одного курса терапии необходимо два флакона лекарственного препарата. Для профилактики ОРВИ и гриппа при контакте с больным и/или при переохлаждении 2 – 3 капли в каждый носовой ход через день за 30 минут до завтрака в течение 10 дней. При однократном контакте достаточно одного закапывания. Для одного курса профилактики ОРВИ и гриппа достаточно одного флакона лекарственного препарата. В случае необходимости профилактические

Старая редакция	Новая редакция
курсы повторяют. После закапывания рекомендуется помассировать пальцами крылья носа в течение нескольких минут для равномерного распределения препарата в носовой полости. Если по окончании курса профилактики или лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. *Инструкция по приготовлению раствора препарата* 1. Аккуратно потяните за пластиковую насадку на стеклянном флаконе, следуя направлению стрелок на алюминиевой защите.  2. Пластиковая крышка вместе с частью алюминиевой защиты снимется.	курсы повторяют. После закапывания рекомендуется помассировать пальцами крылья носа в течение нескольких минут для равномерного распределения препарата в носовой полости. Если по окончании курса профилактики или лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. *Инструкция по приготовлению раствора препарата* 1. Аккуратно потяните за пластиковую насадку на стеклянном флаконе, следуя направлению стрелок на алюминиевой защите.  2. Пластиковая крышка вместе с частью алюминиевой защиты снимется.

Старая редакция	Новая редакция
	
3. Круговым движением снимите оставшуюся часть алюминиевой защиты. Снимите резиновую пробку со стеклянного флакона.	3. Круговым движением снимите оставшуюся часть алюминиевой защиты. Снимите резиновую пробку со стеклянного флакона.
	
4. Откройте флакон с водой для инъекции, отломив его верхнюю часть.	4. Откройте ампулу с водой для инъекций, отломив ее верхнюю часть.
	

Старая редакция	Новая редакция
5. Влейте 5 мл воды для инъекций в стеклянный флакон с сухим веществом.	5. Влейте 5 мл воды для инъекций в стеклянный флакон с сухим веществом.
	
6. Извлеките крышку-капельницу из упаковки, и закрепите ее на горлышке флакона. Перед употреблением взболтайте.	6. Извлеките крышку-капельницу из упаковки, и закрепите ее на горлышке флакона. Перед употреблением взболтайте.
	

Старая редакция	Новая редакция
Из-за необходимости хранения активного вещества в полном вакууме алюминиевая крышка должна быть герметичной и прочной. Медленно снимайте алюминиевую защиту флакона, избегайте порезов. Если крышка откололась во время снятия, можно убрать остальную часть металлического колпачка с помощью ножниц.	Из-за необходимости хранения активного вещества в полном вакууме алюминиевая крышка должна быть герметичной и прочной. Медленно снимайте алюминиевую защиту флакона, избегайте порезов. Если крышка откололась во время снятия, можно убрать остальную часть металлического колпачка с помощью ножниц.
Условия хранения Препарат хранить сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше +25 ° С. Раствор препарата хранить не более 10 дней в холодильнике (не замораживать). Хранить в месте, недоступном для детей.	**Условия хранения** Препарат хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше +25 ° С. Раствор препарата хранить не более 10 дней в холодильнике (не замораживать). Хранить в месте, недоступном для детей.

Генеральный директор А.И. Саулин
ООО «УК Фармаклон»-
управляющей организации ООО «НПП «Фармаклон»