ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
РЕННИ®

Регистрационный номер

Торговое название препарата - РЕННИ®

Международное непатентованное название –

Лекарственная форма – таблетки жевательные

Описание – белые с кремоватым оттенком, квадратные таблетки с вогнутыми поверхностями, гравировкой «Rennie» с обеих сторон, с запахом ментола.

Состав - 1 таблетка содержит
активные вещества: кальция карбонат 680 мг
магния карбонат основной 80 мг
вспомогательные вещества: сахароза (475 мг), крахмал кукурузный прежелатинизированный , крахмал картофельный, тальк, магния стеарат, легкий жидкий парафин, ароматизатор ментоловый, ароматизатор лимонный .

Фармакотерапевтическая группа – антацидное средство.

АТХ: A02AX

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Препарат содержит антацидные вещества - кальция карбонат и магния карбонат, которые обеспечивают быструю и продолжительную нейтрализацию избыточной соляной кислоты желудочного сока, тем самым оказывает защитное действие на слизистую оболочку желудка. Достижение положительного эффекта в течение 3 – 5 минут обусловлено хорошей растворимостью таблеток и высоким содержанием кальция.
Фармакокинетика. В результате взаимодействия Ренни с желудочным соком в желудке образуются растворимые соли кальция и магния.
Уровень абсорбции кальция и магния из этих соединений зависит от дозы препарата. Максимальный уровень абсорбции – 10% кальция и 15-20% магния. Небольшое количество абсорбированного кальция и магния выводится через почки. При нарушении функции почек, уровень концентрации кальция и магния в плазме может возрастать. В кишечнике из растворимых солей образуются нерастворимые соединения , которые экскретируются с калом.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Симптомы, связанные с повышенной кислотностью желудочного сока и рефлюкс -эзофагитом: изжога, отрыжка, периодические боли в области желудка, чувство переполнения или тяжести в эпигастральной области, метеоризм, диспепсия (в т. ч., вызванные погрешностью в диете, приеме лекарств, злоупотребления алкоголем, кофе, никотином), диспепсия беременных.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Тяжелая почечная недостаточность, гиперкальциемия, повышенная чувствительность к компонентам препарата.

ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ.

При применении в рекомендованных дозах препарат не представляет опасности для плода или ребенка.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Взрослые и дети старше 12 лет: если врачом не рекомендовано иначе, при появлении симптомов 1-2 таблетки разжевать (или держать во рту до полного рассасывания). При необходимости можно повторить прием препарата через 2 часа.
Максимальная суточная доза - 16 таблеток.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

При соблюдении рекомендованных доз препарат хорошо переносится, тем не менее, в очень редких случаях возможны аллергические реакции: сыпь, отек Квинке, анафилактические реакции.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Длительное применение препарата в высоких дозах у пациентов с нарушением функции почек может вызвать гипермагниемию, гиперкальциемию, алкалоз, которые проявляются тошнотой, рвотой, мышечной слабостью. В этом случае следует отменить препарат и немедленно обратится к врачу.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ.

Лекарственные препараты следует принимать за 1-2 часа до или после приема антацидных препаратов. *Антибиотики тетрациклинового ряда, фторхинолоны, фосфаты* – при одновременном применении Ренни снижает абсорбцию этих препаратов.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Пациентам с нарушением функции почек не рекомендуется принимать препарат длительно в высоких дозах.
При назначении препарата пациентам с нарушением функции почек следует регулярно контролировать концентрацию магния и кальция в сыворотке крови.
Применение Ренни в высоких дозах может увеличить риск образования камней в почках.
Указание больным сахарным диабетом: 1 таблетка РЕННИ содержит 475 мг сахарозы.
Если применение препарата неэффективно, следует обратиться к врачу за консультацией.

ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ АВТОМОБИЛЕМ И ДВИЖУЩИМИСЯ МЕХАНИЗМАМИ.

Не влияет.

ФОРМА ВЫПУСКА
По 6 таблеток в термосваренный алюминий /ПВХ блистер. По 2, 4, 6, 8 и 16 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.
По 12 таблеток в термосваренный алюминий /ПВХ блистер. По 1, 2, 3, 4 и 8 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить при температуре не выше 25°С, в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ – 5 лет
Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
Без рецепта.

Фирма-производитель:
«Байер Консьюмер Кэр АГ»(Швейцария), произведено «Байер Санте Фамильяль», Франция

Юридический адрес производителя:
Байер Санте Фамильяль , F-74240, рю д'Индюстри 33, Франция.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:
129010, Москва, Грохольский пер.13, стр.2.
Тел.: +7 (095) 234-20-90
Факс: +7(095) 234-20-70

Директор ИДКЭЛС В.В.Чельцов

Представитель фирмы