МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
№ П012507/01- 241013
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

РЕННИ®,

Кальция карбонат + Магния карбонат

таблетки жевательные

таблетки жевательные [охлаждающий вкус]

ЗАО «Байер», Россия,

произведено Делфарм Гайярд, Франция

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» 241013 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Международное непатентованное название –	**Группировочное название**
	Кальция карбонат + Магния карбонат
Показания к применению	**Показания к применению**
Симптомы, связанные с повышенной кислотностью желудочного сока и рефлюкс-эзофагитом: изжога, отрыжка, периодические боли в области желудка, чувство переполнения или тяжести в эпигастральной области, метеоризм, диспепсия (в т. ч., вызванные погрешностью в диете, приеме лекарств, злоупотребления алкоголем, кофе, никотином), диспепсия беременных.	Симптомы, связанные с повышенной кислотностью желудочного сока и рефлюкс-эзофагитом: изжога, кислая отрыжка, периодические боли в области желудка, чувство переполнения или тяжести в эпигастральной области, диспепсия (в том числе, вызванные погрешностью в диете, приемом лекарств, злоупотреблением алкоголем, кофе, никотином), диспепсия беременных.
Противопоказания	**Противопоказания**
Тяжелая почечная недостаточность, гиперкальциемия, повышенная чувствительность к компонентам препарата.	Тяжелая почечная недостаточность, гиперкальциемия, гипофосфатемия, нефрокальциноз, повышенная чувствительность

Старая редакция	Новая редакция
	к компонентам препарата, детский возраст до 12 лет.
Способ применения и дозы	**Способ применения и дозы**
	Внутрь.
Взрослые и дети старше 12 лет: если врачом не рекомендовано иначе, при появлении симптомов 1–2 таблетки разжевать (или держать во рту до полного рассасывания). При необходимости можно повторить прием препарата через 2 часа.	Взрослые и дети старше 12 лет: если врачом не рекомендовано иначе, при появлении симптомов 1–2 таблетки разжевать (или держать во рту до полного растворения). При необходимости можно повторить прием препарата через 2 часа.
Максимальная суточная доза – 16 таблеток.	Максимальная суточная доза – 11 таблеток.
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами	**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**
Лекарственные препараты следует принимать за 1-2 часа до или после приема антацидных препаратов.	Изменение кислотности желудочного сока, во время применения антацидов, может привести к снижению скорости и степени абсорбции других препаратов, при одновременном приеме, поэтому лекарственные препараты следует принимать за 1–2 часа до или после приема антацидных препаратов.
Антибиотики тетрациклинового ряда, фторхинолины, фосфаты – при одновременном применении Ренни снижает абсорбцию этих препаратов.	*Антибиотики тетрациклинового ряда, фторхинолоны, сердечные гликозиды, левотироксин, препараты железа, фториды, фосфаты* – при одновременном применении антациды снижают абсорбцию этих препаратов.
	Тиазидные диуретики – при одновременном приеме с антацидами следует регулярно контролировать концентрацию кальция в сыворотке крови.

Старая редакция	Новая редакция
Особые указания Пациентам с нарушением функции почек не рекомендуется принимать препарат длительно в высоких дозах. При назначении препарата пациентам с нарушением функции почек следует регулярно контролировать концентрацию магния и кальция в сыворотке крови. Применение Ренни® в высоких дозах может увеличить риск образования камней в почках. Указания больным сахарным диабетом: 1 таблетка РЕННИ содержит 475 мг сахарозы. Если применение препарата неэффективно, следует обратиться к врачу за консультацией.	**Особые указания** При назначении препарата пациентам с нарушением функции почек следует регулярно контролировать концентрацию магния, фосфора и кальция в сыворотке крови. Пациентам с нарушением функции почек не рекомендуется длительно принимать препарат в высоких дозах. Применение Ренни® в высоких дозах может увеличить риск образования камней в почках. Указание больным сахарным диабетом: 1 таблетка Ренни® содержит 475 мг сахарозы. Если применение препарата неэффективно, следует обратиться к врачу за консультацией.
Условия хранения Хранить при температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.	**Условия хранения** При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности таблетки жевательные: 5 лет. таблетки жевательные [охлаждающий вкус]: 2 года. Не использовать после истечения срока годности.	**Срок годности** Таблетки жевательные: 5 лет. Таблетки жевательные [охлаждающий вкус]: 3 года. Не использовать после истечения срока годности.
Условия отпуска из аптек Без рецепта.	**Условия отпуска** Без рецепта.
Фирма-производитель: «Байер Консьюмер Кэр АГ», (Швейцария), произведено «Байер Санте Фамильяль», Франция.	**Производитель** ЗАО «Байер», Россия Произведено: Делфарм Гайярд, 33, рю д'Индюстри, 74240 Гайярд, Франция

Старая редакция	Новая редакция
Юридический адрес производителя: Байер Санте Фамильяль, F-74240, рю д'Индюстри 33, Франция. **Дополнительную информацию можно получить по адресу:** 107113, г. Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2. Тел.: +7(495) 231-12-00 Факс: +7(495) 231-12-02	**Дополнительную информацию можно получить по адресу:** 107113, г. Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2. Тел.: +7(495) 231-12-00 Факс: +7(495) 231-12-02

Менеджер по регистрации Олейник Е.Ф.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Г.Р. №054141 "БАЙЕР" А/О "BAYER" * МОСКВА *