

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Идринол®

наименование лекарственного препарата

раствор для внутривенного и парабульбарного введения 100 мг/мл

лекарственная форма, дозировка

ЗАО «ФармФирма «Сотекс», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «___» 200516 20___ г.


Старая редакция	Новая редакция
Торговое название препарата: Идринол®	Торговое название препарата: ИДРИНОЛ® Далее по тексту читать ИДРИНОЛ®.
Состав 1 мл раствора содержит: <i>активное вещество:</i> мельдония дигидрат без адсорбированной влаги – 100 мг (в пересчете на мельдоний безводный – 80,21 мг); <i>вспомогательные вещества:</i> вода для инъекций.	Состав на одну ампулу <i>Действующее вещество:</i> Мельдония дигидрат - 500,00 мг без адсорбированной влаги в пересчете на мельдоний - 401,05 мг безводный <i>Вспомогательное вещество:</i> Вода для инъекций - до 5,00 мл
Лекарственная форма: раствор для внутривенного и парабульбарного введения.	Лекарственная форма: раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы В связи с возможностью развития возбуждающего эффекта препарат рекомендуется применять в первой половине дня. Сердечно-сосудистые заболевания В составе комплексной терапии – внутривенно по 500 мг – 1,0 г (5-10 мл раствора для внутривенного и парабульбарного введения 100 мг/мл), применяя всю дозу сразу или разделив ее на 2 введения. Курс лечения – 10-14 дней. Повторные курсы (обычно 2-3 раза в год) – по рекомендации врача. Нарушения мозгового кровообращения В острой фазе нарушения мозгового кровообращения вводят внутривенно по 500 мг (5 мл раствора для внутривенного и парабульбарного введения 100 мг/мл) 1 раз в сутки в течение 10 дней. Сниженная работоспособность, физическое перенапряжение (в том числе у спортсменов) При умственных и физических нагрузках (в том числе у спортсменов) назначают внутривенно по 500 мг (5 мл раствора для внутривенного и парабульбарного введения 100 мг/мл) 1 раз в сутки. Курс лечения - 10-14 дней. Синдром абстиненции при хроническом алкоголизме (в комбинации со специфической терапией) При синдроме абстиненции применяют	Способ применения и дозы В связи с возможностью развития возбуждающего эффекта препарат рекомендуется применять в первой половине дня. ИДРИНОЛ® применяют внутривенно (в/в), внутримышечно (в/м) и парабульбарно. Способ введения, дозы и продолжительность курса лечения устанавливают индивидуально, в зависимости от показаний, тяжести состояния и др. Сердечно-сосудистые заболевания В составе комплексной терапии: - ишемической болезни сердца (инфаркт миокарда) в/в струйно по 500-1000 мг в день, применяя одномоментно или разделив ее на два введения; - ишемической болезни сердца (стабильная стенокардия); хронической сердечной недостаточности и дисгормональной кардиомиопатии в/в струйно по 500-1000 мг в сутки, применяя одномоментно или разделив ее на два введения, или в/м по 500 мг 1-2 раза в сутки, курс лечения 10-14 дней, с возможным последующим переходом на прием мельдония внутрь. Максимальный курс лечения 4-6 недель. Нарушения мозгового кровообращения В составе комплексной терапии в острой фазе по 500 мг 1 раз в сутки в/в в течение 10 дней, с возможным последующим

Старая редакция	Новая редакция
внутривенно по 500 мг (5 мл раствора для внутривенного и парабульбарного введения 100 мг/мл) 2 раза в сутки. Курс лечения – 10-14 дней. Офтальмопатология (гемофтальм и кровоизлияния в сетчатку глаза различной этиологии, тромбоз центральной вены сетчатки и ее ветвей, ретинопатии различной этиологии (диабетическая, гипертоническая). Препарат вводят парабульбарно по 50 мг (0,5 мл раствора для внутривенного и парабульбарного введения 100 мг/мл) в течение 10 дней, в том числе в составе комбинированной терапии.	переходом на прием мельдония внутрь по 500-1000 мг. Максимальный курс лечения — 4-6 недель. При хронической недостаточности мозгового кровообращения (дисциркуляторной энцефалопатии) по 500 мг в/м или в/в 1 раз в сутки в течение 10 дней, затем с возможным последующим переходом на прием мельдония по 500 мг внутрь. Максимальный курс лечения — 4-6 недель. Повторные курсы проводят по рекомендации врача (обычно 2-3 раза в год). Офтальмопатология (гемофтальм и кровоизлияния в сетчатку различной этиологии, тромбоз центральной вены сетчатки и ее ветвей, ретинопатии различной этиологии (диабетическая, гипертоническая)) Препарат вводят парабульбарно по 50 мг в течение 10 дней, в том числе в составе комбинированной терапии. Умственные и физические перегрузки По 500 мг в/м и в/в 1 раз в сутки. Курс лечения — 10-14 дней. При необходимости лечение повторяют через 2-3 недели. Хронический алкоголизм По 500 мг в/м или в/в 2 раза в сутки. Курс лечения — 7-10 дней.
Форма выпуска Раствор для внутривенного и парабульбарного введения 100 мг/мл.	Форма выпуска Раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного

Старая редакция	Новая редакция
По 5 мл в ампулы бесцветного стекла. По 5 ампул в контурную ячейковую упаковку. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению в пачку из картона.	введения 100 мг/мл. По 5 мл в ампулы бесцветного стекла с цветным кольцом разлома или с цветной точкой и насечкой и/или с дополнительными цветными идентификационными кольцами или иной кодировкой. По 5 ампул в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой или пленки полимерной, или без фольги и без пленки. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.
Условия хранения Список Б. При температуре не выше 25 °С. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.	Условия хранения При температуре не выше 25 °С. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.

Начальник медицинского отдела
ЗАО «ФармФирма «Сотекс»



Тихонова И.В.

Тихонова И.В.
По доверенности
№ 713 от 25.12.15