

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ИДРИНОЛ®

наименование лекарственного препарата

раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения, 100 мг/мл

лекарственная форма, дозировка

ЗАО «ФармФирма «Сотекс», Россия



наименование производителя, страна


Изменение № 4

Дата внесения Изменения «__» **311017** 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Способ применения и дозы В связи с возможностью развития возбуждающего эффекта препарат рекомендуется применять в первой половине дня. ИДРИНОЛ® применяют внутривенно (в/в), внутримышечно (в/м) и парабульбарно. Способ введения, дозы и продолжительность курса лечения устанавливают индивидуально, в зависимости от показаний, тяжести состояния и др.	Способ применения и дозы В связи с возможностью развития возбуждающего эффекта препарат рекомендуется применять в первой половине дня. ИДРИНОЛ® применяют внутривенно (в/в), внутримышечно (в/м) и парабульбарно. Способ введения, дозы и продолжительность курса лечения устанавливают индивидуально, в зависимости от показаний, тяжести состояния и др.

Старая редакция	Новая редакция
<i>Сердечно-сосудистые заболевания</i> В составе комплексной терапии: - ишемической болезни сердца (инфаркт миокарда) в/в струйно по 500-1000 мг в день, применяя одномоментно или разделив ее на два введения; - ишемической болезни сердца (стабильная стенокардия); хронической сердечной недостаточности и дисгормональной кардиомиопатии в/в струйно по 500-1000 мг в сутки, применяя одномоментно или разделив ее на два введения, или в/м по 500 мг 1-2 раза в сутки, курс лечения 10-14 дней, с возможным последующим переходом на прием мельдония внутрь. Максимальный курс лечения 4-6 недель.	<i>Сердечно-сосудистые заболевания</i> В составе комплексной терапии: - ишемической болезни сердца (инфаркт миокарда) в/в струйно по 500-1000 мг в день, применяя одномоментно или разделив ее на два введения; - ишемической болезни сердца (стабильная стенокардия); хронической сердечной недостаточности и дисгормональной кардиомиопатии в/в струйно по 500-1000 мг в сутки, применяя одномоментно или разделив ее на два введения, или в/м по 500 мг 1-2 раза в сутки, курс лечения 10-14 дней, с возможным последующим переходом на прием мельдония внутрь. Максимальный курс лечения 4-6 недель.
<i>Нарушения мозгового кровообращения</i> В составе комплексной терапии в острой фазе по 500 мг 1 раз в сутки в/в в течение 10 дней, с возможным последующим переходом на прием мельдония внутрь по 500-1000 мг. Максимальный курс лечения — 4-6 недель. При хронической недостаточности мозгового кровообращения (дисциркуляторной энцефалопатии) по 500 мг в/м или в/в 1 раз в сутки в течение 10 дней, затем с возможным последующим переходом на прием мельдония по 500 мг внутрь. Максимальный курс лечения — 4-6 недель. Повторные курсы проводят по рекомендации врача (обычно 2-3 раза в	<i>Нарушения мозгового кровообращения</i> В составе комплексной терапии в острой фазе по 500 мг 1 раз в сутки в/в в течение 10 дней, с возможным последующим переходом на прием мельдония внутрь по 500-1000 мг. Максимальный курс лечения — 4-6 недель. При хронической недостаточности мозгового кровообращения (дисциркуляторной энцефалопатии) по 500 мг в/м или в/в 1 раз в сутки в течение 10 дней, затем с возможным последующим переходом на прием мельдония по 500 мг внутрь. Максимальный курс лечения — 4-6 недель. Повторные курсы проводят по рекомендации врача (обычно 2-3 раза в

Старая редакция	Новая редакция
год). Офтальмопатология (гемофтальм и кровоизлияния в сетчатку различной этиологии, тромбоз центральной вены сетчатки и ее ветвей, ретинопатии различной этиологии (диабетическая, гипертоническая)) Препарат вводят парабульбарно по 50 мг в течение 10 дней, в том числе в составе комбинированной терапии. Умственные и физические перегрузки По 500 мг в/м и в/в 1 раз в сутки. Курс лечения — 10-14 дней. При необходимости лечение повторяют через 2-3 недели. Хронический алкоголизм По 500 мг в/м или в/в 2 раза в сутки. Курс лечения — 7-10 дней.	год). Офтальмопатология (гемофтальм и кровоизлияния в сетчатку различной этиологии, тромбоз центральной вены сетчатки и ее ветвей, ретинопатии различной этиологии (диабетическая, гипертоническая)) Препарат вводят парабульбарно по 50 мг в течение 10 дней, в том числе в составе комбинированной терапии. Умственные и физические перегрузки По 500 мг в/м и в/в 1 раз в сутки. Курс лечения — 10-14 дней. При необходимости лечение повторяют через 2-3 недели. Хронический алкоголизм По 500 мг в/м или в/в 2 раза в сутки. Курс лечения — 7-10 дней. <u>Порядок работы с пластиковой ампулой</u> 1. Взять ампулу и встряхнуть ее, удерживая за горлышко. Сдавить ампулу рукой, при этом не должно происходить выделение препарата, и вращающими движениями повернуть и отделить клапан.  Повернуть клапан и открыть пластиковую ампулу 2. Через образовавшееся отверстие немедленно соединить шприц с ампулой.  Вставить канюлю шприца без иглы в отверстие ампулы

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения 100 мг/мл. По 5 мл в ампулы бесцветного стекла с цветным кольцом разлома или с цветной точкой и насечкой и/или с дополнительными цветными идентификационными кольцами или иной кодировкой. По 5 ампул в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой или пленки полимерной, или без фольги и без пленки. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.	3. Перевернуть ампулу и медленно набрать в шприц ее содержимое.  Набрать в шприц содержимое ампулы 4. Надеть иглу на шприц. Форма выпуска Раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения 100 мг/мл. По 5 мл в ампулы бесцветного нейтрального стекла тип I с цветным кольцом разлома или с цветной точкой и насечкой. На ампулы дополнительно наносят одно, два или три цветных кольца и/или двухмерный штрих-код, и/или буквенно-цифровую кодировку или без дополнительных цветных колец, двухмерного штрих-кода, буквенно-цифровой кодировки. По 5 ампул в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и пленки полимерной или без пленки. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению в пачке из картона. По 5 мл в ампулы полимерные из полиэтилена низкой плотности высокого давления. По 5 или 10 ампул вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

Старая редакция	Новая редакция
Производитель ЗАО «ФармФирма «Сотекс» 141345, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Березняковское, пос. Беликово, д. 11 Тел./факс: (495) 956-29-30. Срок годности. 5 лет. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. Владелец регистрационного удостоверения: ЗАО «ФармФирма «Сотекс». Претензии потребителей направлять по адресу производителя.	Производитель ЗАО «ФармФирма «Сотекс» Россия, 141345, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Березняковское, пос. Беликово, д.10, д. 11, д. 12. или ООО «Славянская аптека» Россия, 601125, Владимирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский Срок годности В ампулах стеклянных — 5 лет. В ампулах полимерных — 2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение и организация, принимающая претензии потребителей: ЗАО «ФармФирма «Сотекс» 141345, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Березняковское, пос. Беликово, д. 11 Тел./факс: (495) 956-29-30

Начальник медицинского отдела
 ЗАО «ФармФирма «Сотекс»



Тихонова И.В.

ТИХОНОВА И.В.
 ПО ДОВЕРЕННОСТИ
 № 1085 ОТ 19.12.16