

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать приём/использование этого лекарства.

- Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.
- Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.
- Это лекарство назначено лично Вам, его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ЭМОКСИПИН

Регистрационный номер:

Торговое название: Эмоксипин

Международное непатентованное название или группировочное название:
метилэтилпиридинол&

Химическое название: 3-Окси-6-метил-2-этилпиридина гидрохлорид

Лекарственная форма: капли глазные

Состав:

1 мл раствора содержит:

Активное вещество:

Метилэтилпиридинола гидрохлорид - 10,0 мг

Вспомогательные вещества:

Натрия сульфит - 2,5 мг;

Натрия бензоат - 2,0 мг;

Калия дигидрофосфат - 5,4 мг;

Натрия гидрофосфата додекагидрат - 6,5 мг;

Метилцеллюлоза водорастворимая - 6,5 мг;

Вода для инъекций - до 1 мл

Описание: бесцветная или слабоокрашенная, слегка опалесцирующая жидкость.

Код АТХ: S01XA.

Фармакотерапевтическая группа: антиоксидантное средство.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Препарат снижает проницаемость капилляров, укрепляет сосудистую стенку, стабилизирует мембрану клетки, тормозит агрегацию тромбоцитов, уменьшает свертываемость и вязкость крови, обладает антиагрегационным и антигипоксическим действием.

Фармакокинетика

Препарат быстро проникает в ткани глаза, где происходит его депонирование и метаболизм. В тканях глаза концентрация выше, чем в крови. Обнаружено 5 метаболитов, представленных дезалкилированными и конъюгированными продуктами его превращения. Метаболизируется в печени. Метаболиты выводятся почками. Связывается с белками плазмы крови в среднем на 42 %.

Показания к применению

- лечение и профилактика воспалений и ожогов роговицы;
- лечение кровоизлияний в переднюю камеру глаза;
- лечение и профилактика кровоизлияний в склеру у лиц пожилого возраста;
- тромбоз центральной вены сетчатки и ее ветвей;
- лечение осложнений близорукости;
- диабетическая ретинопатия.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы

Препарат закапывают в конъюнктивальную полость по 1-2 капли 2-3 раза в день.

Продолжительность курса лечения зависит от течения заболевания (обычно составляет 3-30 дней) и определяется врачом. При наличии показаний и хорошей переносимости.

симости препарата курс лечения может быть продолжен до 6 месяцев или повторяться 2-3 раза в год.

Побочное действие

Возможно ощущение жжения, зуд, кратковременная гиперемия конъюнктивы, редко - местные аллергические реакции.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата (при закапывании в конъюнктивальный мешок) не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат не следует смешивать с другими лекарственными растворами.

Особые указания

При необходимости одновременного применения других глазных капель, препарат закапывают последним, после полного всасывания предыдущего лекарственного средства (не ранее, чем через 15 минут).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

См. раздел «Противопоказания».

Форма выпуска

Капли глазные 1 %. 5 мл во флаконы стеклянные. 1 флакон с крышкой-капельницей и инструкцией по применению препарата помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок хранения

2 года. Срок годности препарата после вскрытия -- 1 месяц.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

По рецепту.

Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии: Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, 25. Тел./факс (495) 678-00-50 / 911-42-10.

Производитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, 25.



Директор

ФГУП «Московский эндокринный завод»

Руденко В.Ф.