

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Моксонидин-СЗ

торговое наименование лекарственного препарата

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,2 мг, 0,3 мг и 0,4 мг

лекарственная форма, дозировка

НАО «Северная звезда», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 3Дата внесения Изменения « » 151020 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит: <u>дозировка 0,2 мг:</u> <i>действующее вещество:</i> моксонидин – 0,2 мг <i>вспомогательные вещества (ядро):</i> кроскармеллоза натрия (примеллоза) – 3,0 мг; лактозы моногидрат (лактопресс) (сахар молочный) – 95,3 мг; кремния диоксид коллоидный (аэросил) – 0,5 мг; натрия стеарилфумарат – 1,0 мг; <i>вспомогательные вещества (оболочка):</i> Опадрай II (спирт поливиниловый, частично гидролизованный – 1,32 мг; титана диоксид Е 171 – 0,6027 мг; тальк – 0,6 мг; макрогол (полиэтиленгликоль 3350) – 0,3705 мг; лецитин соевый Е 322 – 0,105 мг; краситель железа оксид (II) желтый – 0,0003 мг; краситель железа оксид (II) красный – 0,0015 мг). <u>дозировка 0,3 мг:</u> <i>действующее вещество:</i> моксонидин – 0,3 мг <i>вспомогательные вещества (ядро):</i> кроскармеллоза натрия (примеллоза) – 3,0 мг; лактозы моногидрат (лактопресс) (сахар молочный) – 95,2 мг; кремния диоксид коллоидный (аэросил) – 0,5 мг; натрия стеарилфумарат – 1,0 мг; <i>вспомогательные вещества (оболочка):</i> Опадрай II (спирт поливиниловый, частично гидролизованный – 1,32 мг; титана диоксид Е 171 – 0,6003 мг; тальк – 0,6 мг; макрогол (полиэтиленгликоль 3350) – 0,3705 мг; леци-	Состав: 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит: <u>дозировка 0,2 мг:</u> <i>действующее вещество:</i> моксонидин – 0,2 мг <i>вспомогательные вещества (ядро):</i> кроскармеллоза натрия (примеллоза) – 19,5 мг; лактозы моногидрат (лактопресс) (сахар молочный) – 47,7 мг; целлюлоза микрокристаллическая 102 – 25,0 мг; повидон К 30 (поливинилпирролидон среднемолекулярный) – 6,2 мг; кремния диоксид коллоидный (аэросил) – 0,4 мг; натрия стеарилфумарат – 1,0 мг; <i>вспомогательные вещества (оболочка):</i> гипромеллоза – 1,60 мг; полисорбат-80 (твин-80) – 0,46 мг; тальк – 0,45 мг; титана диоксид Е 171 – 0,488 мг; алюминиевый лак на основе красителя кармуазин – 0,002 мг. <u>дозировка 0,3 мг:</u> <i>действующее вещество:</i> моксонидин – 0,3 мг <i>вспомогательные вещества (ядро):</i> кроскармеллоза натрия (примеллоза) – 19,5 мг; лактозы моногидрат (лактопресс) (сахар молочный) – 47,6 мг; целлюлоза микрокристаллическая 102 – 25,0 мг; повидон К 30 (поливинилпирролидон среднемолекулярный) – 6,2 мг; кремния диоксид коллоидный (аэросил) – 0,4 мг; натрия стеарилфумарат – 1,0 мг; <i>вспомогательные вещества (оболочка):</i> гипромеллоза – 1,60 мг; полисорбат-80

Старая редакция	Новая редакция
тин соевый Е 322 – 0,105 мг; алюминиевый лак на основе красителя пунцового [Понсо 4R] – 0,0039 мг; алюминиевый лак на основе красителя солнечный закат желтый – 0,0003 мг). <u>дозировка 0,4 мг:</u> действующее вещество: моксонидин – 0,4 мг вспомогательные вещества (ядро): кроскармеллоза натрия (примеллоза) – 3,0 мг; лактозы моногидрат (лактопресс) (сахар молочный) – 95,1 мг; кремния диоксид коллоидный (аэросил) – 0,5 мг; натрия стеарилфумарат – 1,0 мг; вспомогательные вещества (оболочка): Опадрай II (спирт поливиниловый, частично гидролизованный – 1,32 мг; титана диоксид Е 171 – 0,5751 мг; тальк – 0,6 мг; макрогол (полиэтиленгликоль 3350) – 0,3705 мг; лецитин соевый Е 322 – 0,105 мг; алюминиевый лак на основе индигокармина – 0,0018 мг; алюминиевый лак на основе красителя азорубин – 0,0153 мг; алюминиевый лак на основе красителя пунцового [Понсо 4R] – 0,0123 мг).	(твин-80) – 0,64 мг; тальк – 0,45 мг; титана диоксид Е 171 – 0,30 мг; алюминиевый лак на основе красителя кармуазин – 0,01 мг. <u>дозировка 0,4 мг:</u> действующее вещество: моксонидин – 0,4 мг вспомогательные вещества (ядро): кроскармеллоза натрия (примеллоза) – 19,5 мг; лактозы моногидрат (лактопресс) (сахар молочный) – 47,5 мг; целлюлоза микрокристаллическая 102 – 25,0 мг; повидон К 30 (поливинилпирролидон средне-молекулярный) – 6,2 мг; кремния диоксид коллоидный (аэросил) – 0,4 мг; натрия стеарилфумарат – 1,0 мг; вспомогательные вещества (оболочка): гипромеллоза – 1,60 мг; полисорбат-80 (твин-80) – 0,64 мг; тальк – 0,45 мг; титана диоксид Е 171 – 0,29 мг; алюминиевый лак на основе красителя кармуазин – 0,02 мг.

Генеральный директор
НАО «Северная звезда»



Е.В. Чуглина