

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

ГИДРОПЕРИТ ТАБЛЕТКИ 1,5 г

Регистрационный номер:

Торговое название: Гидроперит, таблетки для приготовления раствора для местного и наружного применения 1,5 г

Химическое название: Пероксигидрат мочевины, карбамида пероксид
(комплексное соединение перекиси водорода с мочевиной)

Лекарственная форма:

Таблетки для приготовления раствора для наружного применения

Состав:

На одну таблетку гидроперита 1,5 г

Описание:

Таблетки белого цвета со слегка заметными вкраплениями прозрачных кристаллов, легко растворимые в воде. Таблетки могут быть с риской и без риской.

Фармакотерапевтическая группа:

Антисептики и дезодорирующие средства.

Код АТХ [D02AE]

Фармакологические свойства:

Антисептическое средство. При растворении в воде высвобождается перекись водорода, которая оказывает антисептическое, очищающее, гемостатическое, дезодорирующее действия. При контакте с поврежденной кожей и слизистыми распадается с выделением молекулярного кислорода, который окисляет различные субстраты. Разрушает протеины, кровь, гной, очищает раны.

Показания к применению:

Обработка загрязненных кровоточащих ран, остановка капиллярных кровотечений и т.п. В дерматологической практике применяется в качестве депигментирующего средства.

Противопоказания:

Повышенная индивидуальная чувствительность.

Способ применения и дозы:

Для получения раствора, соответствующего приблизительно 1 % раствору перекиси водорода, растворяют 2 таблетки в 100 мл воды.

Для полоскания полости рта и горла растворяют одну таблетку в стакане воды (0,25 % раствор перекиси водорода).

Свежеприготовленный раствор перекиси водорода применяют наружно. Поврежденные участки кожи или слизистой оболочки обрабатывают ватным или марлевым тампоном, смоченным раствором перекиси водорода, или орошают струей.

Побочное действие:

Возможно чувство жжения при обработке раны, в редких случаях аллергические реакции.

Особые указания:

Не рекомендуется использовать препарат под окклюзионные повязки. Следует избегать попадания в глаза. Не применять для орошения полостей. Не принимать внутрь.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Нет

Форма выпуска:

По 6 или 8 штук в контурную безъячейковую или контурную ячейковую упаковку.

По 6, 8, 10, 20 таблеток в банки полимерные или в банки светозащитного стекла.

На банку наклеивают этикетку. Допускается нанесение маркировки непосредственно на банку.

Каждую банку или одну контурную упаковку вместе с инструкцией помещают в пачку из картона.

Допускается укладка ячейковых и безъячейковых упаковок препарата и банок в групповую упаковку (коробку картонную) с равным количеством инструкций по применению.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 20 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года. Не применять лекарственное средство по истечении срока, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек:

Препарат отпускается без рецепта врача.

Производитель:

ОАО «Самарамедпром»,
446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 99 Б.
Тел./факс (846) 373-81-07

Генеральный директор
ОАО «Самарамедпром»

И.Л.Стышнев

