

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Нафтизин Реневал,
капли назальные, 0,05 % и 0,1 %

Акционерное общество
«Производственная фармацевтическая компания Обновление», РФ

Изменение № 4

Дата внесения Изменения «14» 03 22 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы При ринитах назначают в каждый носовой ход: • <i>взрослым</i> по 1-3 капли 0,05 % - 0,1 % препарата 3-4 раза в сутки; • <i>детям от 1 года до 6 лет</i> по 1-2 капли 0,05 % препарата 1-3 раза в день; • <i>детям от 6 до 18 лет</i> по 2 капли 0,05 % препарата 1-3 раза в день. При носовых кровотечениях применяют тампоны, смоченные 0,05 % препаратом. Для облегчения риноскопии – после очистки носа в каждый носовой ход закапать 3-4 капли или ввести тампон, смоченный в 0,05 % препарате и оставить на 1-2 минуты. При ринитах курс лечения не должен превышать 5-7 дней у взрослых и не более 3 дней у детей.	Способ применения и дозы При ринитах назначают в каждый носовой ход: • <i>взрослым</i> по 1-3 капли 0,05 % - 0,1 % препарата 3-4 раза в сутки; • <i>детям от 1 года до 6 лет</i> по 1-2 капли 0,05 % препарата 1-3 раза в день; • <i>детям от 6 до 18 лет</i> по 2 капли 0,05 % препарата 1-3 раза в день. При носовых кровотечениях применяют тампоны, смоченные 0,05 % препаратом. Для облегчения риноскопии – после очистки носа в каждый носовой ход закапать 3-4 капли или ввести тампон, смоченный в 0,05 % препарате и оставить на 1-2 минуты. При ринитах курс лечения не должен превышать 5-7 дней у взрослых и не более 3 дней у детей.

Старая редакция	Новая редакция
	Порядок работы с тубик-капельницей с клапаном:  1. Повернуть клапан и открыть тубик-капельницу (необходимо убедиться, что раствор находится в нижней части тубик-капельницы). 2. Нажать на тубик-капельницу и закапать необходимое количество препарата в носовой ход. 3. Надавить на клапан и закрыть тубик-капельницу до щелчка после каждой процедуры. Порядок работы с тубик-капельницей с винтовой горловиной:  1. Докрутить винтовую крышку тубик-капельницы до упора. 2. Острие, находящееся под крышкой, проколет верхушку тубик-капельницы. 3. Открыть тубик-капельницу. 4. Нажать на тубик-капельницу, зафиксировав между большим и указательным пальцами одной руки. Закапать необходимое количество препарата в носовой ход. 5. После использования плотно закрыть винтовую крышку по часовой стрелке. Форма выпуска Капли назальные, 0,05% и 0,1%.

Старая редакция	Новая редакция
По 2 мл в тьюбик-капельницы с клапаном или по 10 мл, 15 мл, 20 мл в тьюбик-капельницы с винтовой горловиной из полиэтилена высокого давления. Тьюбик-капельницы с винтовой горловиной укупоривают крышками навинчиваемыми из полимерных материалов. 1 тьюбик-капельницу по 2 мл, 10 мл, 15 мл, 20 мл или 2, 5, 10 тьюбик-капельниц по 2 мл с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары. 20 тьюбик-капельниц по 10 мл, 15 мл, 20 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары (Для стационаров). 640 тьюбик-капельниц по 10 мл, 96 тьюбик-капельниц по 15 мл или 70 тьюбик-капельниц по 20 мл равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона (Для стационаров). 640 тьюбик-капельниц по 10 мл, 96 тьюбик-капельниц по 15 мл или 70 тьюбик-капельниц по 20 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку.	По 2 мл в тьюбик-капельницы с клапаном или по 10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл в тьюбик-капельницы с винтовой горловиной из полиэтилена высокого давления. Тьюбик-капельницы с винтовой горловиной укупоривают крышками навинчиваемыми из полимерных материалов. 1 тьюбик-капельницу по 2 мл, 10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл или 2, 5, 10 тьюбик-капельниц по 2 мл с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары. 20 тьюбик-капельниц по 10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары (Для стационаров). 640 тьюбик-капельниц по 10 мл, 96 тьюбик-капельниц по 15 мл или 70 тьюбик-капельниц по 20 мл, 25 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона (Для стационаров). 640 тьюбик-капельниц по 10 мл, 96 тьюбик-капельниц по 15 мл или 70 тьюбик-капельниц по 20 мл, 25 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку.

Руководитель департамента регистрации
АО «ПФК Обновление»



В.В. Нецко

В.В. Нецко