

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

МЕДОКАЛМИЗОН

наименование лекарственного препарата

**раствор для внутримышечного
введения 100 мг/мл + 2,5 мг/мл**

лекарственная форма, дозировка

**Общество с ограниченной ответственностью «Велфарм»
(ООО «Велфарм»), Россия**

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения « ____ » _____ 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Фармакологические свойства Фармакодинамика <i>Толперизона гидрохлорид</i> является центральным миорелаксантом. В результате мембраностабилизирующего и местноанестезирующего действия препятствует проведению нервных импульсов в первичных афферентных волокнах и двигательных нейронах, блокируя спинномозговые моно- и полисинаптические рефлексy. Вероятно, толперизон опосредует блокирование выделения медиаторов путем блокады поступления ионов кальция в синапсы. Тормозит проведение возбуждения по ретикулоспинальным путям ствола головного мозга. Вне зависимости от влияния на централь-	Фармакологические свойства Фармакодинамика <i>Толперизона гидрохлорид</i> – миорелаксant центрального действия. Оказывает мембраностабилизирующее, местноанестезирующее действие, тормозит проведение нервных импульсов в первичных афферентных волокнах и двигательных нейронах, что приводит к блокированию спинномозговых моно- и полисинаптических рефлексов. Предположительно, толперизон опосредует блокирование выделения медиаторов путем торможения поступления ионов кальция в синапсы. Тормозит проведение возбуждения по ретикулоспинальному пути в стволе головного мозга. Независимо от влияния на центральную

Изменение № 1 к инструкции по применению С.2

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ

от 24.09.2024 № 20458
(Входящий МЗ № 4273274)

Старая редакция	Новая редакция
ную нервную систему усиливает периферическое кровообращение. Это действие не связано с воздействием препарата на центральную нервную систему и может быть обусловлено слабым спазмолитическим и антиадренергическим действием толперидона. <i>Лидокаина гидрохлорид</i> обладает местноанестезирующим действием и при дозировании согласно инструкции системного действия не оказывает. Фармакокинетика По тексту.	нервную систему (ЦНС) усиливает периферическое кровоснабжение. Это действие не связано с воздействием препарата на центральную нервную систему и может быть обусловлено слабым спазмолитическим и антиадренергическим действием толперидона. <i>Лидокаина гидрохлорид</i> обладает местноанестезирующим действием и при дозировании согласно инструкции системного действия не оказывает. Фармакокинетика По тексту.
Условия хранения В защищенном от света месте при температуре от 8 до 15 °С. Хранить в местах, недоступных для детей.	Условия хранения В защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °С. Хранить в местах, недоступных для детей.
Производитель/ Организация, принимающая претензии Общество с ограниченной ответственностью «Велфарм» (ООО «Велфарм»), Россия Курганская обл., г. Курган, проспект Конституции, д. 11 Тел.: (3522) 48-60-00 e-mail: fsk@velpharm.ru Сообщить о нежелательных реакциях можно по телефону (3522) 55-51-80 или на сайте: www.brwaygroup.ru, в разделе «ПРОДУКЦИЯ» – «Фармаконадзор».	Производитель/ Организация, принимающая претензии Общество с ограниченной ответственностью «Велфарм» (ООО «Велфарм»), Россия Курганская обл., г. Курган, проспект Конституции, д. 11 Тел.: +7 (3522) 48-60-00 E-mail: fsk@velpharm.ru Сообщить о нежелательных реакциях можно по телефону +7 (3522) 55-51-80 или на сайте: www.brwaygroup.ru, в разделе «ПРОДУКЦИЯ» – «Фармаконадзор».

Представитель фирмы



О. Г. Дегтярева