

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ФОСФОГЛИВ® ФОРТЕ**Регистрационный номер:****Торговое название:** Фосфоглив® форте**Химическое название:** фосфолипиды + тринатриевая соль глицирризиновой кислоты.**Группировочное название:** фосфолипиды + глицирризиновая кислота**Лекарственная форма:** капсулы.**Состав.****Активные вещества:**

Липоид ППЛ-400

- 400,0 мг

фосфолипиды в пересчете на 100 % вещество – 300,0 мг

(основной компонент - фосфатидилхолин 73-79 %),

Тринатриевая соль глицирризиновой кислоты (натрия глицирризинат) - 65,0 мг.

Вспомогательные вещества: бутилгидрокситолуол, спирт этиловый сорт «люкс» или «экстра» (этанол), масло подсолнечное или масло кукурузное**Вспомогательных веществ оболочки капсулы:**

капсулы твердые желатиновые №0.

Корпус и крышка

титана диоксид, краситель железа оксид красный, краситель железа оксид черный, краситель железа оксид желтый, желатин.

Описание: капсулы твердые желатиновые №0; корпус и крышка капсулы - коричневого цвета.

Содержимое капсулы – масляная пастообразная масса от светло-желтого до оранжево-коричневого цвета со слабым специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа: гепатопротекторное средство**Код АТХ:** [A05AX]**Фармакологические свойства.**

Комбинированное средство. Оказывает мембраностабилизирующее, гепатопротекторное и противовирусное действие.

Фосфатидилхолин (основной компонент фосфолипидов) является основным структурным элементом клеточных и внутриклеточных мембран, способен восстанавливать их структуру и функции при повреждении, оказывая цитопротекторное действие.

Нормализует белковый и липидный обмены, предотвращает потерю гепатоцитами ферментов и других активных веществ, восстанавливает дезинтоксикационную функцию печени, ингибирует формирование соединительной ткани, снижая риск возникновения фиброза и цирроза печени.

Глицират (глицирризиновая кислота и соли) обладает противовоспалительным действием, подавляет репродукцию вирусов в печени и других органах за счет стимуляции продукции интерферонов, повышения фагоцитоза, увеличения активности естественных клеток-киллеров. Оказывает гепатопротекторное действие благодаря антиоксидантной и мембраностабилизирующей активности. Потенцирует действие эндогенных глюкокортикостероидов, оказывая противовоспалительное и противоаллергическое действие при неинфекционных поражениях печени.

При поражениях кожи за счет мембраностабилизирующего и противовоспалительного действия компонентов ограничивает распространение процесса и способствует регрессу заболевания.

Фармакокинетика.

Компоненты препарата хорошо всасываются в кишечнике, как в виде целой молекулы, так и биоактивных продуктов их гидролиза (ненасыщенные жирные кислоты, холин, глициррето-



вая кислота), которые после всасывания через стенки кишечника легко проникают в печень, легкие, кожу и другие органы.

Показания к применению.

Вирусный гепатит (острый и хронический), жировая дегенерация печени (гепатоз), другие поражения печени (лекарственные, алкогольные, токсические), цирроз печени, интоксикации, псориаз, нейродермит, экзема.

Противопоказания.

Гиперчувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет.

Способ применения и дозы.

Принимают внутрь, во время еды, запивая небольшим количеством жидкости.

Взрослым по 1-2 капсулы 3 раза в сутки, детям старше 12 лет – по 1 капсуле 3 раза в сутки.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами.

Не описано.

Побочное действие

При повышенной индивидуальной чувствительности возможно появление кожной сыпи, которая исчезает после отмены препарата.

Редко, при превышении суточных доз, могут отмечаться: задержка натрия и жидкости, что проявляется периферическими отеками и повышением артериального давления, гипокалиемия. При появлении указанных симптомов, в зависимости от их выраженности, необходимо уменьшить дозу препарата и/или назначить спиронолактон по 50-100 мг в сутки.

Передозировка.

Не отмечена

Форма выпуска.

Капсулы.

По 30, 50, 100, 200 или 300 капсул в пластиковые контейнеры с крышками из полиэтилена высокого давления или пропилена или банки полимерные, укупоренные крышками с контролем вскрытия с влагопоглощающей вставкой.

По 10 капсул в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

1 контейнер или 2, 3, 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения.

Список Б. В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте

Срок годности.

3 года. По окончании срока годности препарат не использовать.

Условия отпуска.

По рецепту.

Наименование и адрес изготовителя/организация, принимающая претензии.

ОАО «Фармстандарт-Лексредства», 305022, Россия, г. Курск, ул. 2-ая Агрегатная, д.1а/18

Тел./факс: (4712) 34-03-13

Представитель

ОАО «Фармстандарт - Лексредства»

И.О. директора ИДКЭЛС



С.В.Барыкин

А.Н. Васильев